

## Micosis Cutánea

Las infecciones fúngicas de la Piel son Patologías de carácter benigno que no implican riesgo alguno para la vida del paciente y se manifiestan en casi todos los colectivos. El calor, la humedad y una higiene algo deficiente hace que sea la época estival el periodo en que existe una mayor incidencia de este tipo de micosis.

El incremento de hábitos que facilitan el contagio de este tipo de uso de piscinas comunitarias, gimnasios o instalaciones deportivas (con duchas).

### Dermatofitosis o tiñas

Son un tipo de micosis cutáneas superficiales, causadas por hongos filamentosos que presentan una gran afinidad por los tejidos.


La tiña capitis o el cuero cabelludo. Son los agentes causales más comunes de este tipo de tiña ampliamente difundida son dermatofitos del género *Microsporum* y *Trichophyton*.

### Candidiasis intertriginosa

Conocida también como intertrigo candidiásico, es un tipo de infección micótica producida por *Candida albicans* que afectan a la áreas de la Piel que forman las Plegues cutáneas (axilas, inguinal, mamarario, submamarario, etc).

También han sido localizadas este tipo de lesiones en las Plegues abdominales típicas de personas obesas y en los espacios y en los espacios interdigitales, sobre todo en áreas de casa y en individuos que utilizan guantes durante largos periodos.

Para su tratamiento con antimicrobianos sea más efectiva, se debe procurar actuar, en la medida de lo posible, sobre los factores desencadenantes (higiene, obesidad, hiperhidratación), ya que esta será la única forma de evitar que las infecciones se manifiesten periódicamente.

Next Dude 

## Pitiriasis Versicolor

Puede ser considerada como una de las micosis cutáneas de mayor importancia dada su elevada incidencia (sobre todo en verano), su cronicidad, evolución y las frecuentes recidivas que presenta. Su tratamiento establecido haya sido el adecuado.

Su agente causal, *Malassezia furfur*, en la forma patológica de *Pityrosporum orbiculare*, un mohó saprofito normal de la piel humana que en determinadas condiciones de temperatura, sudoración y humedad da lugar a la infección fúngica.

Las lesiones que se originan se localizan con mayor frecuencia en la parte alta del tronco y se manifiestan con mayor frecuencia en la parte del tórax y se manifiestan como manchas en forma cuales.

## Tratamiento de las micosis cutáneas

La mayoría de las micosis cutáneas se resuelven satisfactoriamente tras la aplicación de un correcto y adecuado tratamiento tópico, siempre y cuando se sigan paralelamente unos hábitos higiénicos y unas medidas preventivas para que eviten que la infección no se disemine, ni se vuelva a instaurar tras su curación.

