ANTROPOLOGÍA MEDICA II

Dr: ALFREDO LOPEZ LOPEZ
ALUMNA: YARI HERNANDEZ CAHACH

PAR CRANEAL

- **OLFATORIO** → Al explorar este nervio se realiza ofreciendo al paciente sustancias conocidas y no irritantes (estimulan el V par craneal): chocolate, café, jabón.
- **Oftálmico/ óptico** → explorar mediante los exámenes de agudeza visual, campimetría y fondo de ojo.La agudeza visual se valora con las pruebas específicas para visión de lejos (tabla de Snellen) y visión cercana
- **Nervios motor ocular común (III), patético (IV) y motor ocular externo (VI): oculomotores** — Destaca por su interés la parálisis del III par craneal. Existen dos tipos:. Parálisis completa:y imcopleta,motilidad ocular intrínseca. tamaño y simetría pupilar y Reflejo foto motor y consensual.
- **Nervio trigémino (V)** → Se trata de un nervio mixto, que recoge la sensibilidad de las mucosas nasal y bucal.
- **Nervio facial (VII)** → por tratarse de un nervio mixto su exploración se divide entres partes: Función motora Funciones sensitiva y vegetativa..
- **Nervio vestibulococlear (VIII)** → Tiene dos porciones, acústica y vestibular y deben de explorarse por separado.
- **Nervios glosofaríngeo (IX) y vago (X)** → examinan juntos porque inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Con la boca abierta explorar la faringe y comprobar si los pilares se contraen simultáneamente a tocar la faringe con el depresor y si esta maniobra produce náuseas (reflejo nauseoso)
- **Nervio espinal o accesorio (XI)** — explora con dos maniobras: ordenando al paciente girar la cabeza contra la mano del observador mientras éste con la otra mano palpa el músculo esternocleidomastoideo, o pidiendo al paciente que eleve o encoja los hombros contra resistenc
- **Nervio hipogloso (XII)** → Se explora solicitando al paciente que protruya la lengua y que la movilice en todas las direcciones.