- **₩ UNIVERSIDAD DEL SURESTE**
- ⊗ ANTROPOLOGIA MEDICA II
- **⊗** SEGUNDO SEMESTRE
- ₩ CUARTO PARCIAL
- **№ FECHA DE ENTREGA: 26/06/2022**

- No se realiza su examen de rutina.
- Su alteración se debe a causas locales (tabaquismo, rinitis).
- Se ofrece sustancias al paciente, alternando las fosas nasales ocluyendo la colateral.
- Motalidad extrínseca para determinar ptosis palpebral.
- Examen de fijación y mirada sostenida se pide al paciente que siga con la vista un dedo en una distancia de 30 o 60cm.
- Motalidad intrínseca valora el tamaño y simetría pupilar.
- Reflejo fotomotor al iluminar cada ojo con una furente de luz comprobando la contracción pupilar.
- · Se divide en tres partes.
- \* Se busca asimetría en las expresiones faciales.
- Se determina el gusto.

- Se exploran juntos.
- Se explora la faringe en busca delreflejo nauseoso.
- \* Se solicita que el paciente diga (a).

- Se explora por exámenes de agudezavisual, campimetría y fondo de ojo.
- \* Campimetría por confrontación.
  - El examen de fondo de ojo se realiza con un oftalmoscopio en busca de cambios degenerativos.
  - Nervio mixto.
  - Motora (se pide al paciente que apriete algo entre los dientes o abra la boca contra resistencia).
  - Sensitiva (se utiliza un algodón o alfiler).
  - refleja (reflejo corneal, al tocar suavemente la córnea del paciente).
  - Dos porciones acústicas y vestíbulo coclear.
  - Prueba de rinne.

ESTIBULOCOCLEA

- \* Prueba de weber.
- Marcha en tandem, prueba debarany y prueba de romberg.
- Se ordena al paciente girar la cabeza contra la mano del observador y se palpa el esternocleidomastoideo.
- O encoja los hombros contra resistencia.
- Se le pide al paciente que protuya la lengua y la movilice en todas las direcciones.