

Nombre del alumno:

Rudy Ángel Osvaldo Vázquez
Zamorano

Nombre del profesor:

Dr. Karina Romero Solórzano

Nombre del trabajo:

“ ESQUEMA DE LADME;
ESQUEMA DE VIAS DE ADMINISTRACION;
ESQUEMA DE TIPOS DE PRESENTACION DE MEDICAMENTOS ”

Grado: 4-º. Semestre.

Grupo: “A”

Categoría,

Seguridad,

Descripción,

Fármacos de uso
frecuente.

Categoría A.

Estudios controlados
no han demostrado
riesgos.

Estudio adecuados en
embarazadas no han
demostrado riesgo
para el feto durante
el primer trimestre,
y tampoco hay evidencia
de riesgo en el resto
del embarazo, son
tenidas las posibilida-
des de daño fetal.


Falso folico, hidroxido
de aluminio, hidroxido
de magnesio, sulfato
ferroso, Vit B1, B12,
B6, C, (Vit A es
categoría A pero en
altas dosis es X)

Categoría B.

No hay riesgos
descritos para el feto
humano.

Estudio en animales
no han demostrado
riesgo teratogénico:
no hay estudios
controlados en mujeres
embarazadas o bien
los estudios en animales
han mostrado efectos
secundarios no confirmados
en mujeres embarazadas.
Generalmente, se acepta
el uso de estos medica-
mentos

Amoxicilina/AC, Clavulánico
ampicilina/subactam,
cefalosporinas, cimetidina,
erytromicina, clindamicina,
clotrimazol, metronidazol
nitroglicerina, insulina,
ranitidina, dimenhidrinato,
letivizina, (Ketoprofeno,
es B 1er y 2do T; Don
el 3er T).



Categoría

Seguridad

Descripción

Fármacos de uso
Frecuente.

Categoría C

No puede
descartarse
riesgo fetal

Estudios sobre animales
han mostrado efectos
secundarios (tales
como teratogénes, embrioci-
das viables), sin que
exista estudios controlados
en nuevas gestantes;
o no se dispone de
estudios en animales
ni en humanos. Estos
fármacos se utilizarán
solo en caso de que los
beneficios superen a los
potenciales riesgos
fetales.


Amikacina, gentamicina,
ciprofloxacina, claritromicina,
cotrimoxazol, isoniazida, androval,
dexa metasona, dextropropofano,
Ceftriaxona (1er y 2do T, 3er T, y
en dosis prolongadas), diclofenaco,
ketorolaco: Celecoxib y naproxeno
(1er y 2do T, 3er T); ASA, aspir
1er y 2do T, 3er T (ó todos dosis),
Lactopril (1er T, 2do y 3er T)

Categoría D.

Hay indicios
de riesgo
fetal.

A pesar los posibles
beneficios del fármaco
pueden ser aceptados a
pesar el riesgo (por
ejemplo si el fármaco
se requiere para
tratar una enfermedad
grave para la que no
pueda usarse otros
fármacos más seguros)

Alprazolam, diazepam, Carbamazepina,
zalcitabina, estreptomina,
fenitoina, procarbamol.



Categoría

Seguridad

Descripción

Patrones de uso frecuente.

X




Contraindicados en el embarazo

Tanto los estudios en animales, como en humanos han puesto de manifiesto evidentes riesgos para el feto que superan claramente cualquier beneficio

Atorvastatina,
clomifeno,
anticonceptivos orales combinados
y hormonoterapia de reemplazo,
desogestrel,
etinilestradiol,
dihidroclotiazida,
isotretinoína,
warfarina,
y tiamina a altas dosis.



Escala del dolor EVA...



Presentación de medicamentos ...



Jarabes



Cápsulas



Tabletas





Suspensión



Supositorios



Inyectables




✓





Inhalados







Optálmica



Oval




Sublingual. ✓




Rectal




Ótico




Cutáneo



Intravenoso



Intraósea.



Latia arterial

