



Universidad del Sureste
CAMPUS COMITÁN
Licenciatura en Medicina Humana

Nombre del trabajo

LADME

Materia

Terapia farmacológica

Grado y grupo

4to A

Nombre alumna

Johana Nazareth Vázquez Flores

Nombre de docente

Dra. Karina Romero Solórzano

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de Febrero 2022

■ **CLASE A** Medicamentos seguros durante el embarazo, ácido fólico, vitamina B6, ácido ascórbico, hierro, calcio, potasio & levotiroxina.

■ **CLASE B** No parecen causar defectos congénitos graves o daños al feto, acetaminofén, aspirato, corticoides, insulina, amoxicilina, ácido clavulánico, azitromicina, ibuprofeno (evitar de SDG 32)

■ **CLASE C** Incluyen riesgo, amikacina, atenolol, clonazepam, fluconazol, dexametasona, beclometasona, cafeína, carbamazepina, inmunoglobulina Anti (HIV) & ciprofloxacina

■ **CLASE D** Riesgo para el feto pero se acepta la administración si no se dispone de otro fármaco, ASA, diazepam, litio, valproato, fenitoína, bleomicina, metotrexato & alcohol


■ **CLASE X** Contraindicado totalmente, isotretinoína, accutane, nandrolona, alcohol, drogas, mupirocilo, talidomida, simvastatina

Antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes & anxiolíticos


Embarazo: Ningún psicofármaco ha sido aprobado por la FDA para su uso durante el embarazo, por esto su empleo depende de la valoración de los riesgos & los beneficios que se pueden obtener con el tratamiento

Lactancia: La decisión de continuar o no la lactancia en madres medicadas con psicofármacos surge del balance entre los riesgos & los beneficios & debe tomarse en cada caso en particular


escala de dolor



anatomía de la piel



PARIENTAL



Intramuscular 90°
 Medicamento inyectado dentro del músculo



Subcutánea 45°
 Se aplica directamente entre la epidermis - dermis



Intravenosa 25°




Intradermica $10-15^\circ$
 La administración es en la capa de la dermis

PARENTERAL



Vía intratecal
Acceso rápido, fácil & eficaz
al sistema vascular



ENTERAL

Vía oftálmica



ENTERAL



Vía oral

P e e t c d

r s n a i n




SOLUCIÓN EN JARABE



PARACETAMOL
120 mg / 5ml

AMOXICILINA
500 mg / 5ml




SOLUCIÓN INYECTABLE




AMIKACINA
500mg / 2ml

CEFTRIAXOMA
500 mg




CREMA



MICONAZOL
100 g / 2g

KETOCONAZOL
15g



UNGUENTO



MUPIROCINA
15g

ACICLOVIR
15g



CAPULAI



AMOXICILINA / AMBROXOL
500 mg / 30 mg

DICLOTRICINA
250 mg



TABLET



CANDESARTAN
16 mg

THP / TCA
160mg / 800mg



SUPOLITARIO



KLPIROKSEN / PARASETAMOL
100 mg / 200mg

Metolazim
500mg



INHALADOR




SALMETEROL
50 ug / 100 ug

SALBUTAMOL
15ml



ÜSÜLÜ



CLOTRIMAZOL
200 mg

METRONIDAZOL
500 mg