

Nombre del alumno: Brenda Nataly Galindo Villarreal

Nombre del profesor: Karina Romero Solórzano

Nombre del trabajo: Glosario farmacología

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Terapéutica Farmacológica

Grado: 4to Semestre Grupo: "B"

Metamizol Sódica: Analgesia

Antipirético

> Presentación: vía oral

IV

IM

Rectal

Tabletas 500 mg

Suspensión 250 mg/5ml

Supositorios 300 mg

Inyectable 1gr/2ml

> Efectos adversos: efectos gastrointestinales

Hipoplasia

Hipotensión

> Dosis: Adultos: 500 mg cada 6/8 hrs.

D.M.: 3-5 mg diarios

Dosis pediátrica: lactantes > 4 meses y niños hasta

4 años: 50-100 mg hasta 4 veces por día

Niños de 5 a 14 años: 250-375 mg.

Naproxeno: Analgesia

Antiinflamatorio

Antipirético

> Presentación: vía oral/Rectal

Tabletas 250 mg/500 mg/550 mg

Suspensión 2.5 gr/100 ml

> Efectos adversos: Gastritis

Úlceras gástricas/deudonales

> Dosis: D. pediátrica: 10 mg/kg de peso seguida de 2.5-5 mg/kg
cada 8 hrs. No exceder 15 mg/kg/día.

500 mg cada 8 hrs.


Adulto: D. max. 1500 mg diarios

• Sinergia con paracetamol



Antipirético

- > Presentación: vía oral/rectal/iv.
 - Tabletas 250 mg/500 mg
 - Supositorios 300 mg
 - Goteras 100 mg/ml
 - Suspensión 3.2 gr/100 ml
- > Efectos adversos: Hepatotóxico
- Efectos gastrointestinales
 - Sinergia con Naproxenol/Tramadol
- > Dosis: Dosis pediátrica: 60 mg/kg/día
- Adulto: 500-700 mg cada 6/8 hrs.
- Max: 4 gr/día




→ INHIBIDORES COX-2

Meloxicam: - Osteoartritis

- Artritis reumatoide
- Gota
- Es analgésico, antiinflamatorio
- > Presentación: vía oral
- Tabletas: 7.5 y 15 mg.
- > Dosis: 7.5 mg cada 12 hrs
- 15 mg cada 24 hrs.
- No exceder 15 mg/día
- Sinergia con metocarbamol

Piroxicam: Osteoartritis

- Espondilitis anquilozante
- Capsulitis
- Tendinitis
- Miositis
- Lumbalgia
- Es analgésico y antiinflamatorio
- > Presentación: Oral
- Tabletas 20 mg
- > Dosis: 20 mg c/12 hrs
- 40 mg c/24 hrs.
- No exceder 40 mg diarias
- NO MÁS DE 5 DÍAS





ANTOLOGÍA

INDICACIONES TERAPÉUTICAS, Mecanismo de acción, Efectos adversos
Presentaciones.



Acido Acetilsalicílico: Absorción rápida con PH ácido
Acción antiinflamatoria
Antipirética
Analgésica
Antiagregante plaquetario



> Modo de administración: Oral Tabs: • 500 mg
• 300 mg
• 100 mg

> Contraindicaciones: • Úlceras gástricas o duodenales
• Trastornos de coagulación
• Puede provocar Sx Reye
• Asma

> Reacciones adversas: • Hemorragias
• Vómito
• Urticaria
• Angioedema

> Dosis: Dosis máxima: 4gr/día

Ibuprofeno: • Analgesia
• Antipirético
• Antiinflamatorio

> Presentaciones: Vía oral (cápsulas, tabletas)
Suspensión 2gr/100 ml
Tabletas o cápsulas: 400 mg
600 mg
800 mg

> Reacciones adversas: Epigastralgia
Vómito/Náuseas
Pirosis
Sx de Steve Johnson

> Dosis: Adultos: 200-400 mg/6hr



Indometacina: Analgesia

Antinflamatoria

↳ Presentación: vía oral / vía rectal

Tabletas 25 mg

Supositorios 100 mg

Parto pretérmino: 100 mg cada 12 hrs.

↳ Efectos adversos: Cefalea

Náuseas

Vómito

Gastritis

Necrosis tubular Renal

Cierre prematuro del conducto arterioso

↳ Dosis: DM 200 mg diarios

VERY DAY
A CHANGE
10 CHANGE
your life

Ketorolaco: Analgesia

↳ Presentación: vía: Oral

Sublingual

Intravenosa

Intramuscular

• Tabletas 10 mg, 30 mg

• Inyectable 30 mg

↳ Efectos adversos: Gastritis

Úlceras gástricas.

↳ Dosis: Dosis máxima vía oral 40 mg

Dosis máxima intramuscular 120 mg

Dosis max. intravenosa 180 mg

Dosis pediátrica: 0.75 mg/kg

Dosis máx: 60 mg día

= Sinergia con Tramadol (analgesico opiáceo).

Celecoxib: Osteoartritis y Artritis Reumatoide.

Alivio de signos y síntomas de la espondilitis anquilosante.

Manejo del dolor agudo.

Tratamiento de la dismenorrea primaria

> Presentación: Vía oral

Tabletas: 100 mg
200 mg

> Efectos adversos: gastrointestinales

> Dosis: Adulto: 100mg q12hrs
200mg q24hrs

D. max: 400 mg/día

ETORICOXIB: Dosis máx: 120 mg diarias.

