



Francisco Javier Pérez López

Kevin Esteban López Ramírez

“Cuadro comparativo”

Materia: psiquiatría

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5° semestre

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de marzo del 2022

TRASTORNO

DEPRESIVO

Más frecuente en mujeres que en hombres; 2:1. 400 millones padecen un episodio durante el último año de vida y 600 millones en el transcurso de su vida.

40% de la población su primer episodio a los 20 años, el 50% entre los 21 y 50 años.

Síntoma con un período mínimo de 2 semanas.

Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi a diario.

Factores desencadenantes: Alcoholismo, consumo de drogas, Enfermedades terminales, Situaciones estresantes, aislamiento social.

SINTOMAS

Estado de ánimo irritable.

Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.

Cambio grande en el apetito

BIPOLAR

No hay diferencias en la tendencia entre hombre y mujeres.

La edad de inicio es más frecuente entre los 12 a 25 años de edad.

Promedio de inicio de la enfermedad entre los 22 y 26 años. Prevalencia en 4.5%.

Episodio depresivo cada 3 a 6 meses.

Episodio maniaco, "período diferenciado del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos 1 semana.

Factores desencadenantes: Parto, medicamentos (antidepresivos o esteroides), insomnio, Consumo de drogas psicoactivas.

SINTOMAS

Fácil distracción

Participación excesiva en las actividades

Poca necesidad de dormir

Capacidad de discernimiento deficiente.

TRASTORNO

DEPRESIVO

Cansancio y falta de energía
Sentimientos de inutilidad
Dificultad para concentrarse
Movimientos lentos o rápidos
Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.
Sentimiento de desesperanza o abandono.

BIPOLAR

Poco control del temperamento
Falta de autocontrol y comportamientos imprudentes.
Estado de ánimo muy inestable.
Hablar rápidamente.
Preocupación acerca de cosas que no son ciertas