

Victor Daniel Gonzalez Hernandez

8B 07/03/22

Se trata de paciente masculino de 28 años de edad, con antecedente de diabetes tipo 1 de reciente diagnostico, mal apego al tratamiento medico. Es llevado al servicio de Urgencias por presentar quemaduras. Observandose lesiones hiperemicas, en su periferia area blanqueadas. Se observan algunas ampollas, presenta algunas lesiones donde se es posible ver parte de la aponecrosis, dichas lesiones se encuentran en torax anterior, abdomen anterior, miembro superior derecho cara ante. y ambos miembros inferiores cara anterior y posterior.

Signos vitales: FC 120x' TA 110/70 Temp. 37°C SatO₂ 94%. Peso 85 kg Talla 170 cm glicemia ap. lar HI.

GASA: PH 7.2 pCO₂ 35 satO₂ 93%. HCO₃ 15

1) ¿Que tipo de quemadura presenta el paciente?
Quemadura de Segundo grado Profunda

2) ¿Al paciente se le considera gran quemado? Si, no, porque...
Si porque es mayor del 20% de SC. Además tiene diabetes que es una enfermedad grave asociada.

3) De acuerdo a los datos antes mencionados, ¿especifico su SCQ, como darias la indicacion para manejo de liquidos para los primeros 24 hrs en tu paciente (cantidad y tipo de solucion).
Regla de los 9 y formula de parkland.

SCQ = 38.5%. Primeros 8 hrs 9,945 → Ringer Lactato
Siguientes 16 hrs 9,945

4) Que tipo de insulina utilizarías y la indicacion?
Insulina de accion rapida 12 ml/hra.

5) Aislar al paciente por cualquier infeccion intrahospitalaria, control de signos vitales y de liquidos.