



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Caso clínico: Quemaduras

URGENCIAS

Albores Ocampo Dayan Graciela
Octavo semestre, grupo "B"

Docente: Dr. Romeo Suárez Martínez

Lunes 7 de marzo, 2022
Comitán de Domínguez, Chiapas.

Caso clínico

1. ¿Qué tipo de quemadura es?

Segundo grado: profunda.

2. ¿Al paciente se le considera "Gran quemado"?

Sí; porque cumple criterios: - DM tipo 1
- Sobrepeso agregado

3. Especifica:

SBC:

Regla de los 9 Ta: 18%

Ms: 4.5% = 58.5%

Mi: 36%

Fórmula de Parkland

$(2 \text{ ml}) (85 \text{ kg}) (58.5\%) = 9,945 \text{ ml}$ en 24 hrs.

1. 4,972 ml de solución: Ringer lactato en primeras 8 h.

2. 4,972 ml de solución: Ringer lactato en las siguientes

4. ¿Qué tipo de insulina utilizarías y cómo 16 h.

darías la indicación para su adminis-

tración? Acción rápida.

$0,1 \text{ ui / kg / h} = 8.5 \text{ ui por hora}$

5. ¿Qué otras medidas serían de importancia tener en cuenta para el manejo del px?

1. Realizar asepsia y antisepsia.

2. Analgesia por razón necesaria

3. Control de líquidos en vigilancia = vigilar edema.

4. No aplicar remedios caseros

5. No drenar ampollas