

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Son

Áreas de la Piel Lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Comúnmente se forman donde los huesos están más cerca de la piel.

También tobillos y caderas

Signos y Síntomas

- Como
- Disminución del nivel de conciencia
 - Inmovilidad y parálisis
 - Incontinencia
 - alteraciones en la nutrición: Estado deficiente de Proteína, vitamina C, Hierro, cobre, y el Zinc
 - Enfermedades como ACV, Diabetes mellitus

Podemos encontrar:

Mecanismos que alteran la integridad cutánea

Como

Presión: que es una fuerza que actúa perpendicular a la piel y provoca un aplastamiento en ella, como estar mucho tiempo en una silla, cama, etc.

Fricción: en este se producen rozos, movimientos o arrastres en la piel

Maceración: es cuando la piel tiene exceso de humedad.

Cuidados de enfermería

Mantener vigilancia del estado de la piel a pacientes inmoviles

Cuidados de enfermería

Limpienza de la Herida con lavon neutro y mantener lubricada la piel.

No dejar Arrugas en la portura de la Ropa y en las Cobijas conie Rerosa

Cuidados de enfermería

NO utilizar Bandajes Compresivos - Poner un Papeete semilinesal

Clasificación

Grado I

Leve enrojecimiento Prorogación seca

Grado II

Perdida Parcial del Grosor de la Piel

Grado III

Perdida total del Grosor de la Piel, la Lesión alcanza con una capa de tejido subcutáneo

Grado IV

Perdida total de la Piel con todos los Estructuras Anatómicas tejidos conectivos

tratamiento

Plan básico

Rehidratación de Herida

Limpienza de Herida

Desbridamiento de Herida

Selección de Aparatos para mejorar el Cuidado de Herida

Biografía: manual de habilidades Para cuidadores familiares de personas Mayores