

## SIGNOS CLINICOS

```
graph TD; A[SIGNOS CLINICOS] --> B[AUTISMO]; A --> C[SÍNDROME DE ASPERGER]; B --> D[...]; C --> E[...]
```

### AUTISMO

- No mantiene contacto visual o establece muy poco contacto visual.
- No responde a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres.
- No mira los objetos ni los eventos que están mirando o señalando los padres.
- No señala objetos ni eventos para lograr que los padres los miren.
- No lleva objetos de interés personal para mostrárselos a los padres.
- No suele tener expresiones faciales adecuadas.
- Es incapaz de percibir lo que otros podrían estar pensando o sintiendo al observar sus expresiones faciales.
- No demuestra preocupación (empatía) por los demás.
- Es incapaz de hacer amigos o no le interesa hacerlo.
- No señala cosas para indicar sus necesidades ni comparte cosas con los demás.
- No dice palabras sueltas a los 16 meses.
- Repite exactamente lo que otros dicen sin comprender el significado (generalmente llamado repetición mecánica o ecolalia).

### SÍNDROME DE ASPERGER

- Problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos.
- Dificultades para entender el lenguaje corporal.
- Evitan el contacto visual.
- Desean estar solos o quieren interactuar pero no saben cómo hacerlo.
- Tienen intereses muy específicos, a veces obsesivos.
- Hablan sólo acerca de ellos mismos y de sus intereses.
- Hablan de forma poco usual o con un tono de voz extraño.
- Dificultad para hacer amigos.
- Nerviosismo cuando están en grupos sociales grandes.
- Torpes o descuido.
- Presencia de rituales que se niegan a cambiar, como una rutina muy rígida para irse a dormir.
- Realizan movimientos repetitivos o extraños.
- Muestran reacciones sensoriales poco comunes.