



ABORTO

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

♥ DR. LUIS IGNACIO GAYOSO





Antes de
la semana 20

 < 500g



Inferior a
500 gramos

DEFINICIÓN; Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o antes que el feto alcance 500 gramos de peso.





Aborto espontáneo: Es la interrupción del embarazo en forma espontánea, sin el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica, después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable de manera independiente.


- Amenaza de aborto
- Aborto completo: el feto, la placenta y los otros tejidos se eliminan por sangrado.
- Aborto incompleto: sólo se elimina una parte de los tejidos. Algunos permanecen en el útero. Puede haber abundante sangrado vaginal.
- Aborto retenido: el embrión o el feto muere, pero queda retenido en el útero.
- Aborto séptico: aborto espontáneo que se infecta

MANEJO DEL ABORTO INCOMPLETO

- La evacuación uterina, utilizando una aspiración endouterina manual (AMEU) o por vacío eléctrico.
- De no ser posible se puede utilizar el legrado evacuador que se realiza con cureta bajo anestesia



Aborto inducido: La interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención quirúrgica después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea viable de manera independiente.



Aborto inducido inseguro: Procedimiento para poner fin a un embarazo no deseado, que sea realizado por personas que carecen de las aptitudes necesarias o en un ámbito en el que no se cumplen los mínimos criterios médicos, o con la concurrencia de ambas circunstancias.

- Aborto inducido seguro: Procedimiento médico o quirúrgico llevado a cabo por un profesional capacitado con los medios necesarios y en un ámbito médico adecuado. Implica un riesgo extremadamente bajo para la mujer.





PRINCIPAL COMPLICACIÓN DEL ABORTO: MUERTE MATERNA

Cada minuto ocurren en el mundo:

- 105 abortos
- 35 abortos inseguros

Una muerte materna por aborto cada tres minutos

COMPLICACIONES MÉDICAS

- Aborto incompleto
- Desgarro de cuello uterino
 - Hemorragia
- Perforación uterina
 - Sepsis
- Hematometra agudo
 - Embolia gaseos
- Shock neurogénico o Reacción vagal
 - Reacción anestésica
- Alergias, toxicidad a la lidocaína
 - Amenorrea post AMEU