

**MANEJO CON ANTIBIÓTICOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS INFECCIOSOS AGUDOS**



Infecciones de vías urinarias



Escherichia coli

tx en embarazadas

utilizar la cefalexina, la nitrofurantoína o la combinación trimetoprima-sulfametoxazol.

Tx en niños


En lactantes de 2 meses a 2 años con toxicidad, deshidratación o imposibilidad de retener la ingesta oral, se indican antibióticos parenterales, en general una cefalosporina de tercera generación

Adultos

Trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim, Septra u otros)  
Fosfomicina (Monurol)  
Nitrofurantoína (Macrofantin, Macrobid)  
Cefalexina (Keflex)



Fiebre tifoidea



Salmonella typhi

Tx en embarazadas

el tratamiento con ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación


Tx en niños

la fiebre tifoidea debe tratarse con fluoroquinolonas, incluso en pacientes pediátricos. La ciprofloxacina oral 20-30 mg/kg/d dividido en 2 dosis cada 12 horas (la dosis en adolescentes y adultos 750 mg cada 12 horas)

Tx en adultos

Ciprofloxacino (para adultos no embarazadas) y la ceftriaxona.

Haemophilus influenzae




meningitis

Tx en embarazadas

antibióticos intravenosos y una medicación de cortisona

Tx en niños


antibióticos intravenosos y, a veces, con corticoesteroides.



Tx en niños.  
Se recomienda hidratación, no se recomienda antidiarreicos

Isospora belli

puede tratar la diarrea aguda con medicinas de venta libre como la loperamida link (Imodium) y el subsalicilato de bismuto link (Pepto-Bismol, Kaopectate).



Diarrea

