

# INFECCIONES BACTERIANAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR

## Otitis media aguda

**Etiología**  
 S. pneumoniae, H. influenzae tipo b y H. influenzae no tipificable, y M. catarrhalis. Otros microorganismos encontrados son S. pyogenes, S. aureus y virus como VRS, influenza enterovirus y rinovirus

El diagnóstico de la OMA es generalmente clínico.

Los patógenos más frecuentemente encontrados son P. aeruginosa, S. aureus y Streptococcus sp

**Etiología**

**Diagnostico clínico**


## Otitis externa



## Sinusitis aguda

**Etiología**

Los microorganismos más frecuentes son S. pneumoniae, H. influenzae y en menor proporción, M. catarrhalis



El diagnóstico clínico de sinusitis bacteriana requiere los siguientes datos: infección respiratoria alta severa, inflamación o dolor facial o cefalea

## Faringoamigdalitis

**Duración**

**Etiología viral**

**Etiología bacteriana**

Streptococcus pyogenes (b hemolítico grupo A)

Rhinovirus, adenovirus, parainfluenza, y virus respiratorio sincicial, también virus Coxsackie, ECHO y herpes simplex.



Diagnostico clínico; el cultivo del exudado de la faringe se recomienda en los casos de recurrencia que no mejoran con el tratamiento.

