"MANEJO CON ANTIBIÓTICOS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS INFECCIOSOS AGUDOS".

ITU



E.coli.

1ra etiología en:

Antibióticos parenterales, en general una cefalosporina de tercera generación.

Utilizar la cefalexina, la nitrofurantoína o la combinación trimetoprima-sulfametoxazol.

Trimetoprima/sulfametoxazol, Fosfomicina, Nitrofurantoína, Cefalexina.

Fiebre tifoidea.

salmonella typhi.

1ra etiología en:

Debe tratarse con fluoroquinolonas, ciprofloxacina oral 20-30 mg/kg/d dividido en 2 dosis cada 12 horas (la dosis en adolescentes y adultos 750 mg cada 12 horas).

Ciprofloxacino (para adultos no embarazados) y la ceftriaxona.

El tratamiento con ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación.

Shigelosis.

Disentería bacilar.

1ra etiología en:

El tratamiento es Ciprofloxavino, Ceftriaxona.

Campylobacter jejuni.

Diarreas bacterianas.

1ra etiología en:

Se utiliza de elección eritromicina durante 5 días o en una dosis única de azitromicina oral.

Los antibióticos de elección son eritromicina o azitromicina, especialmente en niños.

Para adultos, si el aislamiento es sensible, se recomienda también ciprofloxacina.