

IVUS	FIEBRE TIFOIDEA	DIARREA	MENINGITIS	DIFTERIA	
Utilizar la cefalexina, la nitrofurantoína o la combinación trimetoprima sulfametoxazol.	El tratamiento con ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación		Antibióticos intravenosos y una medicación de cortisona		EMBARAZADAS
En lactantes de 2 meses a 2 años con toxicidad, deshidratación o imposibilidad de retener la ingesta oral, se indican antibióticos parenterales, en general una cefalosporina de tercera generación	La fiebre tifoidea debe tratarse con fluoroquinolonas, incluso en pacientes pediátricos. La ciprofloxacina oral 20-30 mg/kg/d dividido en 2 dosis cada 12 horas	Se recomienda hidratación, no se recomienda antidiarreicos	Antibióticos intravenosos y, a veces, con corticoesteroides	protidyfteriynu suero antitoxic(GDS). Antitoxina se administra por vía intravenosa y la dosis varía de 20 000 a 100 000 UI.	NIÑOS
Trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim, Septra u otros) Fosfomicina (Monurol) Nitrofurantoína (Macrodantin, Macrobid) Cefalexina (Keflex)	Ciprofloxacino (para adultos no embarazadas) y la ceftriaxona.	Puede tratar la diarrea aguda con medicinas de venta libre como la loperamida link (Imodium) y el subsalicilato de bismuto link (Pepto Bismol, Kaopectate)		suero antitóxico anti-diftérico	ADULTO