

Fiebre tifoidea	Meningitis	IVUS	Diarrea	difteria	
El tratamiento con ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación	Antibióticos intravenosos y una medicación de cortisona	utilizar la cefalexina, la nitrofurantoína o la combinación trimetoprima sulf ametoxazol.			EMBARAZADAS
La fiebre tifoidea debe tratarse con fluoroquinolonas, incluso en pacientes pediátricos. La ciprofloxacina oral 20-30 mg/kg/d dividido en 2 dosis cada 12 horas	Antibióticos intravenosos y, a veces, con corticoesteroides.	En lactantes de 2 meses a 2 años con toxicidad, deshidratación o imposibilidad de retener la ingesta oral, se indican antibióticos parenterales, en general una cefalosporina de tercera generación	Se recomienda hidratación, no se recomienda antidiarreicos	protidyfteriynu suero antitoxic(GDS). Antitoxina se administra por vía intravenosa y la dosis varía de 20 000 a 100 000 UI.	NIÑOS
Ciprofloxacino (para adultos no embarazadas) y la ceftriaxona.		Trimetoprima/sulf ametoxazol (Bactrim, Septra u otros) Fosfomicina (Monurol) Nitrofurantoína (Macrofantin, Macrobid) Cefalexina (Keflex)	Puede tratar la diarrea aguda con medicinas de venta libre como la loperamida link (Imodium) y el subsalicilato de bismuto link (Pepto Bismol, Kaopectate)	suero antitoxico anti-diftérico	ADULTOS