

# **CASO CLINICO: APDENDICITIS**

**MATERIA: TECNICAS QUIRURGICAS BASICAS**

**DOCENTE: DR. ALFREDO LOPEZ**

**6TO SEMESTRE MEDICINA HUMANA  
“UNIVERSIDAD DEL SURESTE”**

**PRESENTA: OSCAR ADALBERTO ZEBADUA LOPEZ**

**26 DE MAYO DE 2022**

Ingresa paciente alerta, consiente, con pupilas normoreactivas y sucoicas al reflejo de la luz, mucosas deshidratadas, ruidos respiratorios sin compromiso alguno, con estos signos vitales

**T/A:** 180/100      **Fr:** 32x<sup>1</sup>      **SPO<sub>2</sub>:** 70%

**Fc:** 120x<sup>1</sup>      **Temperatura:** 39°C

Abdomen blando depresible doloroso a la palpación profunda, peristalcis presente, refiere escalofríos, malestar general, pérdida del apetito e irradiación del dolor abdominal, manifiesta tener diarrea, náuseas y vómito, dolor que inicia al lado del ombligo y que se traslada del lado derecho, alérgico a la “penicilina”

20 años de edad, peso: 107Kg, talla: 165cm, glucosa: 90mmgldl

✓ **Problemas Reales**

**Problema Potenciales**

**T/A:** 180/100

**Fc:** 120x<sup>1</sup>

**Fr:** 32X<sup>1</sup>

**SPO<sub>2</sub>:** 70%

**Temperatura:** 39°C

**Peso:** 165cm

**IMC:** 39.3

**Talla:** 107Kg

(Obesidad Tipo II)



✓ **Intervención Qx**

Se le realizara “**apendicetomía**”, la cual esta indicada para extirpar la apéndice, por medio de procedimiento quirúrgico, la cual se realiza empleando anestesia, ya sea:

**Anestesia raquídea** -- A usted le ponen un medicamento dentro de la espalda para insensibilizarlo de la cintura para abajo. También le administrarán un medicamento para hacerlo dormir.

**Anestesia general** -- Usted estará dormido y no sentirá ningún dolor durante la cirugía.

El cirujano hace una incisión pequeña en el lado inferior derecho del área abdominal y extirpa el apéndice.

**Otra forma de extraer el apéndice:** Se puede extirpar empleando pequeñas incisiones quirúrgicas y una cámara. Esto se denomina apendicectomía laparoscópica.

Si el apéndice se ha roto o se ha formado una cavidad de infección (**absceso**), se lavará el abdomen completamente durante la cirugía. Se puede dejar un tubo pequeño en el área ventral para ayudar a drenar los líquidos o el pus.

#### ✓ **Indicaciones para Qx**

Historia del dolor abdominal persistente, fiebre y signos clínicos de apendicitis,

Si el cuadro clínico no es claro, esperar 4-6 horas a tomar TAC para acelerar el Dx

#### ✓ **Contraindicaciones y Complicaciones de la intervención Qx**

Contraindicaciones:

Perforación apendicular o ruptura de un absceso

