

El diseño de muestras comprendió tres estratos para cada uno de los estados del país.

Diseño de muestra fue estratificado y por conglomerado. La variable de estratificación fue el tipo de escuela: Primaria, secundaria, bachillerato.

Se planeó por conglomerados para optimizar los tiempos de los encuestadores y disminuir el costo de trabajo de campo. La estimación del tamaño se efectuó considerando una tasa de no-respuesta del 20% que es la encontrada en estudios previos y que incluye el ausentismo por diversas causas.

Con base a estos parámetros, se contempló tener una muestra de 1860 estudiantes por estrato para cada una de las ciudades de interés.

Se obtuvo una muestra réplica con el mismo procedimiento, por lo que cada grupo en la muestra principal tuvo su equivalente muestra réplica.

La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, empleando en anteriores encuestas. Se aplicó un cuestionario para primaria y secundaria. Cuestionario de primaria: datos socio demográfico, consumo de alcohol, tabaco, marihuana, inhalables y otras drogas, ambiente social, tolerancia social al consumo de sustancia, disponibilidad y percepción del riesgo de consumo de drogas de alcohol y tabaco.

A nivel nacional más de la mitad de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha bebido alcohol alguna vez en su vida, en los hombres el consumo fue de 34% y en las mujeres 52.5%. El consumo excesivo de alcohol se presenta en el 14.5% de los estudiantes por nivel educativo, 8.6% de los estudiantes de secundaria lo indica, mientras para el bachillerato lo incrementa 24.2%. Estados que muestra mayor prevalencia de consumo mayores EDM, Durango, Jalisco, Michoacán.

La edad promedio de inicio de consumo de alcohol es de 12.6 años. Por sexo, los hombres reportaron iniciar su consumo a los 12.4 años y las mujeres a los 12.8 años.