



DR. JOSE MIGUEL CULEBRO

HANNIA DEL CARMEN SALAZAR JIMENEZ

CRECIMIENTO Y DESARROLLO BIOLÓGICO

CUADRO COMPARATIVO

Nombre	Tratamiento	Características
VIH (VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA)	El tratamiento del VIH implica tomar medicamentos que reducen la cantidad de virus que hay en el cuerpo. Los medicamentos para el VIH se llaman terapia antirretroviral (TAR)	Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga.
SÍFILIS	La sífilis se trata con penicilina. Las parejas sexuales también deben recibir el tratamiento	La primera etapa se caracteriza por la aparición de llagas indoloras en los genitales, el recto o la boca. Una vez que se cura la llaga inicial, la segunda etapa se caracteriza por la aparición de un sarpullido. Luego, no se presentan síntomas hasta la última etapa, que puede ocurrir años después. La etapa final puede provocar daños en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)	Colposcopia: un procedimiento para observar más de cerca el cuello uterino para ver si hay células precancerosas. Crioterapia: un tratamiento para congelar y remover (sacar) las células precancerosas del cuello uterino. LEEP o procedimiento de extirpación electroquirúrgico de lazo: un tratamiento para remover las células precancerosas del cuello uterino con una corriente eléctrica.	Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos
CLAMIDIA	La clamidia se trata con antibióticos. El tratamiento antibiótico recomendado es la	Secreción del pene. Sensación de ardor al orinar. Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene. Dolor e inflamación en uno

	doxiciclina, dos dosis diarias durante siete días o la azitromicina en una única dosis. Se pueden utilizar otros medicamentos alternativos, pero no son tan eficaces como la azitromicina y la doxiciclina	o ambos testículos, aunque esto es menos común
NEISSERIA GONORRHOEAE	se trate con el antibiótico ceftriaxona, administrado por inyección, con azitromicina oral (Zithromax).	incluyen micción dolorosa y excreciones anormales del pene o la vagina. Los hombres sienten dolor en los testículos y las mujeres pueden sentir dolor en la zona inferior del vientre.