



# EZQUIZOFRENIA

Es un trastorno psicótico severo que afecta el pensamiento, las emociones y el comportamiento.

## CAUSAS

- Predisposición genética
- Alteración en las sustancias del cerebro
- Infección en el embarazo

## PREVALENCIA

La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida es de aproximadamente 0.3% a 0,7% aunque existen variaciones según la raza, grupo étnico, país y lugar de origen

La incidencia es mayor en los hombres mientras la definición que permite incluir más síntomas del estado anímico muestra un riesgo igual para ambos sexos

## FASES DE LA EZQUIZOFRENIA

**FASE AGUDA:** Presentan síntomas psicóticos graves, como delirios, alucinaciones y pensamientos gravemente desorganizado

**FASE DE ESTABILIZACION:** En esta fase se reducen los síntomas psicóticos agudo, esta fase suele durar 6 meses o más después del inicio de un episodio agudo

**FASE ESTABLE:** Los síntomas se consideran relativamente estables y en caso haya, son menos graves que en la fase aguda

**MEDICAMENTOS CLASICOS:** Clorpromazina, haloperidol y tioridazina

**ANTIDEPRESIVOS**

**LITIO**

**BENZODIAZEPINA**

**NEUROLEPTICOS ATIPICOS:** Clozapina, risperidona, olanzapina, ziprasidona y quetiapina

## SINTOMAS-TIPOS DE EZQUIZOFRENIA

- Alucinaciones
- Ideas delirantes
- Trastornos del pensamiento
- Retraimiento social
- Desmotivación

**Catatonica:** se caracteriza por alteraciones psicomotoras que no siempre son las mismas aunque suelen ser la inmovilidad.

Incapacidad de hablar y adopción de posturas extrañas

**Hebrefenica:** Se caracteriza por el modo desorganizado en que van apareciendo las acciones de la persona y predomina la pobreza en lenguaje la apatía y anhedonia

**Paranoide:** Sus síntomas presentan más psíquicos que motores, no presentan fallas en la capacidad motora del habla y alucinaciones auditivas y delirios