



Super nota

Nombre del Alumno: Karen Jazziel Bautista Peralta

Nombre del tema: Escalas de valoración y tipos de shock

Parcial: Segundo

Nombre de la Materia: Prácticas profesionales

Nombre del profesor: Lic. Javier Gómez Galera

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Noveno

Pichucalco, Chiapas a 12 de Junio del 2022

ESCALAS DE VALORACIÓN

ESCALA DE GLASGOW

Es una herramienta de utilidad para valorar y registrar el nivel de conciencia de los pacientes, pudiendo identificar alteraciones neurológicas.

Escala de Glasgow

Usado para medir el nivel de consciencia.
 Por debajo de 7 puntos: Coma
 Por debajo de 8 puntos: Intubación

Valor máximo: 15
 Valor mínimo: 3

Respuesta ocular

- Espontánea: 4
- Orden Verbal: 3
- Al dolor: 2
- Sin respuesta: 1

Respuesta verbal

- Orientado: 5
- Desorientado: 4
- Palabras inapropiadas: 3
- Sonidos Incomprensibles: 2
- Sin respuesta: 1

Respuesta motora

- Orden verbal: 6
- Localiza el dolor: 5
- Flexión/retirada: 4
- Flexión anormal (Decorticación): 3
- Extensión (Decerebración): 2
- Sin respuesta: 1

ESCALA DE SILVERMAN

Es un sistema que permite mediante la evaluación de 5 parámetros clínicos, determinar la presencia o ausencia de dificultad respiratoria.

Signo	0	1	2
Aleteo nasal	Leve, ausente	Moderado, discreto	Marcado
Tiro intercostal	Leve, ausente	Moderado, discreto	Marcado
Retracción xifoidea	Leve, ausente	Moderada, discreta	Marcada
Disociación toracoabdominal	Leve, ausente	Moderada, discreta	Marcada (sube y baja)
Quejido espiratorio	Ausente	Intermitente o audible sólo con estetoscopio	Constante o audible a distancia

ESCALAS DE VALORACIÓN

ESCALA DE BRADEN

Evalúa el riesgo de desarrollar úlceras por presión en base a la sensibilidad y humedad de la piel, la fricción de cuerpo con las sábanas, la movilidad, actividad y nutrición de paciente.

puntuación ESCALA DE BRADEN

RIESGO UPP

ALTO = < 12 PUNTOS

MODERADO = 13 - 14 PUNTOS







**BAJO = 15-16 PUNTOS (si < 75 años)
15-18 PUNTOS (si ≥ 75 años)**

ESCALA DE CAPURRO

Es una herramienta usada en neonatología para determinar la edad gestacional de un recién nacido.

TEST CAPURRO

Criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato

FORMA DE LA OREJA (PABELLON)	 0	 8	 16	 24	
TAMAÑO DE GLANDULA MAMARIA	 0	 5	 10	 15	
FORMA DEL PEZON	 0	 5	 10	 15	
TEXTURA DE LA PIEL	 0	 5	 10	 15	 20
PLIEGUES PLANTARES	 0	 5	 10	 15	 20

Se suma 204 + puntaje parcial y se divide entre 7

ESCALAS DE VALORACIÓN

ESCALA DE APGAR

Es un examen rápido que se realiza el primer y quinto minuto después del nacimiento del bebé. El puntaje del minuto 1 determina que tan bien tolero el bebé el proceso de nacimiento. El puntaje del minuto 5 indica que tan bien está evolucionando el bebé por fuera del vientre materno.

ESCALA DE EVA


Se emplea para la valoración del dolor de forma analógica, es decir, por una línea de 10 centímetros que luego será medida para darle un valor numérico a la percepción que tiene el paciente de su dolor.

comental likeal envialol guardalol

Prueba de Apgar

@ingeniumed

Puntos	0	1	2	PUNTAJE
A Apariencia	Cianosis General	Cianosis distal	Rosado	7 - 10 Normal
P Pulso	Ausente	<100 lat/min	>100 lat/min	4 - 6 Depresión Moderada
G Gestos	Ninguno	Algún movimiento	Llanto	0 - 3 Depresión Severa
A Actividad	Flacidez	Tono débil	Bien flexionado	
R Respiración	Ausente	Débil	Intenso / llanto	



TIPOS DE SHOCK

SHOCK HIPOVOLEMICO

Es una pérdida rápida y masiva de la volemia que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos, como traumatismos, hemorragias digestivas, ginecológicas y patología vascular.

SHOCK ANAFILÁCTICO

Reacción sistémica de hipersensibilidad de carácter grave y a veces mortal, consecuencia de la exposición a una sustancia sensibilizante como un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos, un extracto alergénico, un veneno o alguna sustancia química.

SHOCK CARDIOGÉNICO

Se relaciona con un bajo gasto cardíaco (“falla de bomba”), asociado generalmente al infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias graves.

SHOCK SÉPTICO

Hipotensión arterial debida a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos, acompañada de alteraciones de la perfusión (acidosis metabólica o hiperlactacidemia), o requiere de fármacos vaso activos para mantener la presión arterial.

REFERENCIAS

- UNIVERSIDAD DEL SURESTE, 2022
- L.E.E. JAVIER GÓMEZ GALERA-DIAPOSITIVAS ESCALAS DE VALORACIÓN