cuadro sinoptico

Nombre del Alumno: SELENE MANCILLA AVELAR
Nombre del tema: TRASTORNOS COMPULSIVOS OBSECIVOS
Parcial : 1
Nombre de la Materia: PSICOPATOLOGIA
Nombre del profesor: LILEANA VILLEGAS
Nombre de la Licenciatura: PSICOLOGIA
Cuatrimestre: SEXTO CUATRIMESTRE

PICHUCALCO CHIAPAS 14 junio de 2022

- Trastorno obsesivo compulsivo, relacionados con traumas de estrés y disociativos
  - Trastorno compulsivo
    - Obsesiones
      - Pensamientos e imágenes o impulsos
    - compulsiones
      - Repetitivas y persistentes
      - Criterios diagnósticos
        - Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan
        - El sujeto intenta suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizado con otro pensamiento
        - Comportamientos o actos mentales repetitivos
        - El objetivo de los comportamientos es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar, e vitar suceso de timidez o actos no conectados de manera realistas
  - Trastornos dismórfico corporal
    - Preocupados por uno o más defectos de aparecía física
      - Criterios de diagnostico
        - Preocupación por uno o más defectos o imperfecciones
        - Actos mentales repetitivos como respuesta
        - Malestar significativo, deterioro social,
        - Inquietud acerca del peso los cuales cumplen un trastorno de conducta alimentaria
        - Requieren mucho tiempo
        - No se pueden a tribuir a un a efectos fisiológicos
  - Trastorno de acumulación
    - Son dificultades persistentes para deshacerse o separarse de las posesiones
      - Acumulación pasiva de artículos o angustia cuando se deshace de las posiciones
        - criterios
          - Dificultad persistente de deshacerse o renunciar a las posesiones
          - Necesidad percibida de guardar las cosas y al malestar que se siente d cuando se deshacen de ellas
          - Deterioro social
          - Congestionan y abarrotan las zonas habitables y alteran en gran medida se uso previsto
  - tricotomía
    - Trastorno de arrancarse el pelo puede afectar cualquier región del cuerpo
      - Criterios
        - Arrancarse el pelo de manera recurrente
        - Intentos por disminuir o dejar a arrancar el pelo
        - Intentos de mejorar un defecto o imperfección
  - Trastornos de excoriación
    - Es el rascado recurrente de la propia piel cara, brazos y las manos
      - criterios
        - Dañarse la piel de forma recurrente
        - El daño en la piel no se puede a tribuir a efectos por sustancias
        - obsesiones, compulsiones, preocupaciones por el aspecto, acumulación, rascarse la piel
        - se basa en descartar una afección medica destacada, afección fisiopatológica.
        - Consecuencias fisiopatológicas directa de otra afección medica
  - Trastorno de apego reactivo
    - Trastornos compulsivo relacionados a otra afección medica
      - Apego reactivo de la lactancia
        - Los niños no muestran manifestaciones selectivos búsqueda de consuelo
          - Criterios diagnósticos
            - Se ve comprometida la capacidad de regulación emocional, muestran episodio de emociones negativas de miedo, tristeza o irritabilidad que no se explican fácilmente
            - El comportamiento es inhibido, emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos:
              El niño raramente busca consuelo cuando siente malestar, muy pocas veces se deja consolar cuando se siente malestar
              -reacción social y emocional a los de más, afecto positivo ilimitado.
              Muestra irritabilidad, tristeza o miedo inexplicado
            - -La negligencia o carencia socia que se manifiesta por la falta persistente de tener cubiertas las necesidades emocionales básicas para disponer de bienestar, estimulo y efecto por parte de los cuidadores adultes.
            - El trastorno es antes de los 5 años, y no se cumplen los criterios de un autista; El niño tiene un desarrollo

- Trastorno de estrés postraumático
  - Es el desarrollo de síntomas específicos tras la oposición a uno o mas eventos traumáticos
    - Criterios adultos, a adolescentes y niño mayores de 6 años
      - Experiencia directa del suceso traumático
      - Presencia directa del suceso, ocurrido a otros.
      - En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido el violento o accidental.
      - No se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografía, a menos que esta exposición este relacionada con el trabajo.
- Trastorno de estrés agudo
  - De 3 días a 1 mes de duración la exposición a uno o más eventos traumaticos.
    - Son los que se expresan directamente, la agresión física, el combate activo, el atraco
      - Criterios diagnósticos
        - Exposición. La muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza
        - Experiencia de suceso
        - Recuerdo angustiosos recurrentes
        - Exposición repetida extrema a detalles repulsivos el suceso
- Trastorno de ansiedad y somáticos
  - Trastorno de ansiedad por separación
    - La persona encuentra a asustada y ansiosa ante la separación de la persona que se siente el apego
      - criterios
        - Experimentan malestar excesivo recurrente al estar separados de su hogar o de las figuras mayores de apego
        - Se preocupan por el bienestar de la persona de apego
        - La necesidad de conocer el paradero de la persona de apego
  - Mutismo selectivo
    - Se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay una expectativa para hablar
      - criterios
        - Fracaso constante para hablar en situaciones sociales especificas en las que existe expectativas por hablar
        - La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o la comunidad social
        - La duración de la alteración es como mínimo de un mes
        - El haba no se a tribuye por fata de conocimiento o a la comunidad con el lenguaje habla necesario en la situación social
  - Fobia especifica y trastorno de ansiedad social
    - Presenta el miedo hacia situaciones u objetos precisos a los evitan.
      - Criterios
        - Miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación especifica
        - El objeto o la situación fóbica casi siempre provocada miedo o ansiedad inmediata
        - El miedo es persistente dura seis o más meses
  - Trastorno de pánico
    - La persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y esta persistente intranquila o preocupada sobre nuevas crisis cambia de manera desactivada
      - criterios
        - Miedo o ansiedad intensa
        - Estar en espacios abiertos o cerrados
        - Estar en medio de la multitud