



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE (UDS).**

**DOCENTE: SERGIO CHONG VELAZQUEZ**

**ALUMNA: FATIMA GUADALUPE LOPEZ**

**MORALES.**

**LICENCIATURA: MEDICINA**

**VETERINARIA Y ZOOTECNIA.**

**MATERIA: FISIOLOGIA DE LA**

**REPRODUCCION ANIMAL I**

**ACTIVIDAD: ENSAYO**

**TAPACHULA, CHIAPAS A JUEVES 15 DE**

**JULIO DE 2022.**

## **INTRODUCCION**

La Gestación de una perra dura un promedio de 9 semanas, unas 4 veces menos que en la especie humana. De todos modos, puede haber gestaciones un poco más cortas o más largas, sobre todo cuando se tiene en cuenta el día de la monta para hacer la previsión de la fecha del parto. El parto puede adelantarse un poco si la perra trae una camada muy numerosa. El diagnóstico de la Gestación, a diferencia de lo que sucede con otras especies, no suele realizarse mediante tests rápidos puesto que todas las perras darían positivo, debido a los ciclos hormonales normales en el celo. Aunque existen pruebas más específicas, pero poco extendidas, el método de diagnóstico de Gestación más habitual es la ecografía, que no supone ningún riesgo para la perra ni para los fetos. A partir de la tercera semana de Gestación, pueden detectarse vesículas fetales, siendo habitual esperarse hasta los días 23 o 25 de la Gestación para evitar diagnósticos falsos negativos. En estas fechas aún puede que no sea evidente que tu perra está gestante, porque todavía no se ha alcanzado la fase de crecimiento más rápida de los fetos, que suele producirse durante el último tercio de la Gestación, es decir, a partir de las 6 semanas. La radiografía es otra técnica de diagnóstico de la Gestación. Sin embargo, tiene varias limitaciones. Los fetos pueden sufrir efectos adversos si se exponen a radiaciones demasiado pronto. Además, como los huesos no empiezan a calcificarse hasta la semana 7, una radiografía tampoco ayuda demasiado antes de esta semana. En cambio, sí se recomienda usar la radiografía a partir de la semana 7 para calcular el número de cachorros que va a parir la perra. Cuando el número de fetos es abundante, es más fácil contar cabezas o columnas vertebrales en una imagen fija como la radiografía que en una ecografía. Una vez llegados a la semana 9, existen varios métodos para predecir el momento del parto. El más sencillo, y que puede realizarse en casa fácilmente, es medir la temperatura rectal de la perra a intervalos regulares, por ejemplo, cada 12 horas.

## CONTENIDO

Así sabrás cuál es la temperatura normal de tu perra a lo largo del día. La mayoría de las perras experimentan una bajada de la temperatura corporal de un grado centígrado aproximadamente, 24 horas antes del parto. Si has hecho un buen seguimiento, podrás predecir el parto en las siguientes 12-24 horas. El embarazo de la perra es un proceso muy especial que pueden llegar a vivir algunos propietarios. Si bien es una experiencia única y maravillosa cuando la gestación es deseada y se lleva a cabo de forma responsable, también puede suponer un verdadero dolor de cabeza cuando la concepción ha sido accidental y no se cuenta con los hogares suficientes para acoger a todos los pequeños.

- Ciclo: generalmente las perras suelen experimentar el celo dos veces al año, que suele variar entre 4 y 13 meses, no obstante, este no es un indicador fiable, ya que los cambios hormonales pueden alterarlo enormemente. Será muy recomendable prestar atención a otros síntomas.
- Vientre abultado: alrededor de los 30 días de gestación, nuestro veterinario, mediante un examen físico, podrá realizar la palpación del útero que podrá confirmar el estado de preñez.

Estado de los pezones: se trata probablemente del síntoma más evidente de preñez, ya que durante el embarazo los pezones de la perra aumentan su tamaño y se tornan de un color más intenso.

- Flujo vaginal: los cambios en el flujo vaginal de la perra embarazada también son frecuentes. Podremos observar descargas vaginales blancas o transparentes, nunca con sangre, negras o verdes.

- Comportamiento: el comportamiento es un indicador poco fiable para confirmar el embarazo de la perra, pero se trata de un aspecto que no podemos pasar por alto. Puede ocurrir que se muestre anormalmente activa o, por el contrario, mucho más apática. Es habitual que rechace el contacto con otros perros, especialmente machos, y que su actitud hacia nosotros se vuelva más afectuosa o más arisca. También se produce la búsqueda del "nido", es entonces cuando la perra busca lugares sombríos y cómodos para refugiarse y tener allí su camada.
- Vómitos: alrededor de los 35 días de gestación, cuando se produce el giro y repliegue del útero, la perra puede experimentar ciertas molestias que incluyan vómitos.
- Alimentación: la alimentación es un aspecto fundamental en el embarazo de la perra, pero si bien la mayoría aumentan su apetito, algunas rechazan por completo su alimentación habitual. En el apartado de cuidados prestaremos mucha atención a este aspecto tan importante.

El diagnóstico de gestación en las especies domésticas, tiene como objetivo principal determinar a la mayor brevedad posible si la hembra quedó o no gestante en su último servicio, ya que al saber si está vacía esta hembra, se podrán tomar las medidas necesarias a fin de que el siguiente ciclo reciba un servicio efectivo, de esta manera se evita el alargar el periodo de días abiertos que redundaría en una pérdida económica para el productor por tener animales improductivos en su explotación. En la perra, sin embargo, la situación difiere en cuanto a que el determinar la no gestación de la hembra, no permitirá proporcionar un servicio inmediato, puesto que en esta especie pueden transcurrir desde 5 hasta 9 meses para que ocurra el siguiente ciclo.

## CONCLUSION

Por lo general se estima que la duración de la gestación en la perra es de 63 días, sin embargo, considerando la gran variación que existe con respecto al tiempo de ovulación, fertilización, el número de montas y la duración del periodo fértil (estro), se puede hablar de un rango de 58 a 68 días ( $63 \pm 5$ ) y en algunos casos hasta de 70 a 72 días. La Gestación de una perra dura un promedio de 9 semanas, unas 4 veces menos que en la especie humana. De todos modos, puede haber gestaciones un poco más cortas o más largas, sobre todo cuando se tiene en cuenta el día de la monta para hacer la previsión de la fecha del parto. El parto puede adelantarse un poco si la perra trae una camada muy numerosa. Así sabrás cuál es la temperatura normal de tu perra a lo largo del día. La mayoría de las perras experimentan una bajada de la temperatura corporal de un grado centígrado aproximadamente, 24 horas antes del parto. Si has hecho un buen seguimiento, podrás predecir el parto en las siguientes 12-24 horas. El embarazo de la perra es un proceso muy especial que pueden llegar a vivir algunos propietarios. El embarazo de la perra es un proceso muy especial que pueden llegar a vivir algunos propietarios. Si bien es una experiencia única y maravillosa cuando la gestación es deseada y se lleva a cabo de forma responsable, también puede suponer un verdadero dolor de cabeza cuando la concepción ha sido accidental y no se cuenta con los hogares suficientes para acoger a todos los pequeños.