Universidad del sureste

“Pasión por educar”

Materia:

Zootecnia de porcinos

Tema:

Cuadro sinóptico

Alumno:

María Teresa Castillo Tovilla

Tarea #:

3

Tapachula Chiapas, martes 5 de julio del 2022

Manejo porcino

- Antes del parto
  - Cerda desparasitada con anticipación. la cerda sea llevada a la paridera en sistemas al aire libre o a la sala de maternidad en sistemas confinados, con una anticipación de 3 a 4 días a la fecha estimada del parto; esto permite que el animal se adapte al lugar de parición.
- parto
  - Cerda
    - Ayudar a la cerda si es necesario, Mantener luminosidad y buena ventilación. Evitar temperaturas en la sala por encima de los 25º C. Asegurar la limpieza exhaustiva del area de nacimiento. Considerar que los partos normales duran de 30 minutos a 5 horas, con un intervalo de nacimiento entre cada lechón de 15 minutos.
  - Lechón
    - Limpiar a los lechones, dando calor, sacar fluidos de nariz y boca, cortar y ligar cordón umbilical.
- Después del parto
  - Cerda
    - la **cerda** no necesita consumir grandes cantidades de alimento, pero para reequilibrar sus procesos orgánicos y para la producción de leche necesita agua fresca y limpia en cantidad abundante, colocarles a los lechones para que tomen leche.
  - Lechón
    - En los sistemas en confinamiento se debe realizar corte y desinfección de cordón umbilical y descole para evitar el canibalismo que sucede por conductas estereotipadas bajo estos sistemas.Es fundamental mencionar la importancia del **suministro de cama** para el momento del parto (ya sea con fardo de paja de trigo), foco de luz cálida para dar calor, primordiales las do primeras horas de calostro.