



Universidad del sureste. Campus Tapachula.

Zootecnia de Porcinos.

Manejo de cerdas y lechones.

Alumno: Alejandro Morales Tapia.

Profesor: MvZ Roberto Barreda García Sedano.

SEXTO CUATRIMESTRE.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.



MANEJO.

Sistema de identificación individual.

tatuaje

Aplicación de tinta en el pabellón auricular o dorso de la oreja.

muecas.

Consiste en hacer una serie de cortes por el borde de la oreja.

Oreja derecha: indica numero de camada dentro de la exploración

Oreja izquierda.- Número de individuos dentro de la camada

manejo de la reproducción.

Planificación

Establecer flujo constante de los animales.

Medios de producción.

Instalaciones, mano de obra, alimentación etc

lotes.

las cerdas del mismo "lote" se cubren y paren en periodos muy cortos (2-3 días) y son destetadas el mismo día.

lotes semanales. Más popular bandas de 3 semanas.

herramienta para lograr una buena planificación

buen manejo y control del ciclo reproductivo.

el porcino se caracteriza por su alta proliferación.

de lechones por parto entre 9 y 15

Gestación 114 días.

celo en cerdas.

Las cerdas solo aceptan ser cubiertas cuando están en celo.

enrojecimiento, hinchazón y secreciones en la vagina.

se montan o se dejan montar por otras hembras.

cubrisión 7 u 8 meses no antes del 2° celo

Manifiestan celo de 3 a 5 dias post destete.

parto y síntomas.

inquietud, nidación, ubres color grisáceo, Fr. de 20 a 25 x min

duración del parto entre 2 y 6 hrs.

A los 110 días son movidas a las naves de gestación.

tiempo de expulsión de los lechones.

15 a 30 min

en caso de que se alargue ayudar a la madre.

procedimientos post parto.

una vez que el lechón esté afuera se debe limpiar mucosidad de la nariz y de la boca

Importante que el lechón consuma calostro.

Manejo de lechones.

*Quitar hembra y despejar fosas nasales.
*cubrirlo con talco y ponerlos bajo una fuente de calor.

preferencia por las tetas frontales.

*Facil acceso.
*mejor leche.
*mayor seguridad.
* mejor estimulo para la bajada de leche.

el 50% de mortalidad pre-destete ocurre en los primeros dos días de vida del lechón.

cuidado de lechones.

*limpieza con un trapo boca, fosas nasales.
*desinfectar cordón umbilical.
*asegurarse de la ingestión de calostro primeras 24 hrs.

cuidados en los primeros días de nacimiento.
*cortar colas 2-3 dias post parto.
*vitamica c 2° día.
*administrar hiero 5-6 días.
*castración de 10-12 días.
vigilar pezuñas, ombligo, rodillas.