



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno Daniela Yamile Domínguez Pérez

Nombre del tema Parto

Parcial 3

Nombre de la Materia Fisiología de la reproducción animal I

Nombre del profesor Ana Gabriela Villafuerte Aguilar

Nombre de la Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre 3

Introducción

Conocer todas las fases del parto de los bovinos es importante para ver los signos que tiene la vaca antes de que nazca el becerro y poder ayudar antes y después del parto, tratando de evitar complicaciones y saber que cosas pasan alrededor de estas fases y los cuidados de la madre para poder cuidarla junto a su bebé.

→ PARTO ←

Fases del parto

En cuanto a las etapas podríamos decir que el proceso de parto tiene tres etapas bien definidas:

- Dilatación del cérvix: La primera etapa dura de 2 a 3 horas en vacas adultas y de 4 a 6 horas en vaquillonas.
- Nacimiento del ternero: Las contracciones uterinas ayudan al descenso de la cabeza del neonato.
- Expulsión de la placenta

Síntomas del parto

Reconocerá que una vaca está a punto de parir cuando observe:

- Que el vientre, especialmente en el flanco derecho, ha aumentado de tamaño.
- Que la ubre está llena y los pezones rígidos.
- Que la vulva está enrojecida e inflamada con un líquido mucoso y sanguinolento.
- Que el animal está inquieto.
- Que en la vulva aparece la bolsa

Signos de parto inminente:



Cuidados en la madre

La madre se encuentra generalmente muy agotada después del parto por lo que requiere un cuidado muy particular. En casos sospechosos o después de partos difíciles es recomendable convencerse sobre el estado de los órganos reproductores (presencia de otro feto, heridas o perforaciones uterinas y vaginales, hemorragias etc) mediante el examen vaginal.

Retención de la placenta

Es común en bovinos, en específico en vacas lechera.

En el bovino las membranas fetales son expulsadas fisiológicamente dentro de las primeras 12 hrs. después del parto. La retención total o parcial de la misma por un periodo mayor se considera patológico. La complicación más común es la metritis, la cual se evidencia por fiebre, depresión, descargas fétidas y síntomas generales de septicemia.

Cervix

Estructura cartilaginosa de tres anillos que sirve como punto de referencia en palpación del aparato reproductor y sirve para conectar el útero con la vagina.

Bibliografía

Recuperado en la antología de Fisiología de la reproducción animal I en la plataforma UDS el 9 de julio de 2022 en:
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/1078bed99132cacc98008765373f82db-LC-LMV304-FISIOLOGIA%20DE%20LA%20REPRODUCCION%20ANIMAL%20I.pdf>