



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Aimer Leandro Aguilar García

Nombre del tema: parto

Parcial: III

Nombre de la Materia: Fisiología de la reproducción


Nombre del profesor: Ana Gabriela Villafuerte Aguilar

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 3

REPROCCION EN BOVINOS

PARTO



En las vacas, el parto dura normalmente entre 30 minutos y 4 horas desde la aparición del amnios en la vulva hasta la expulsión del ternero. Los partos distócicos son aquellos que se prolongan excesivamente o que requieren una extracción asistida severa del feto.

Las contracciones uterinas comienzan en los extremos de los cuernos provocando el desprendimiento e invaginación de la placenta. La vaca puede alterar el momento del parto por situaciones de estrés o cambios en el manejo, probablemente mediante la liberación de la adrenalina que relaja la musculatura uterina.

FASES DEL PARTO

EN CUANTO A LAS ETAPAS PODRÍAMOS DECIR QUE EL PROCESO DE PARTO TIENE TRES ETAPAS BIEN DEFINIDAS: - DILATACIÓN DEL CÉRVIX, - NACIMIENTO DEL TERNERO, - EXPULSIÓN DE LA PLACENTA. LA PRIMERA ETAPA DURA DE 2 A 3 HORAS EN VACAS ADULTAS Y DE 4 A 6 HORAS EN VAQUILLONAS.

SINTOMAS DEL PARTO

RECONOCERÁ QUE UNA VACA ESTÁ A PUNTO DE PARIR CUANDO OBSERVE:

- QUE EL VIENTRE, ESPECIALMENTE EN EL FLANCO DERECHO, HA AUMENTADO DE TAMAÑO.
- QUE LA UBRE ESTÁ LLENA Y LOS PEZONES RÍGIDOS.
- QUE LA VULVA ESTÁ ENROJECIDA E INFLAMADA CON UN LIQUIDO MUCOSO Y SANGUINOLENTO.
- QUE EL ANIMAL ESTÁ INQUIETO.
- QUE EN LA VULVA APARECE LA BOLSA DEL AGUA.

CUIDADOS DE LA MADRE Y DEL RECIEN NACIDO

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PARTO HACE FALTA TENER EN CUENTA 2 FACTORES MUY IMPORTANTES PARA EL ESTADO DE SALUD DEL TERNERO LA RESPIRACIÓN Y EL OMBLIGO. EN EL GANADO VACUNO EL OMBLIGO SE ROMPE ANTES DE TERMINAR EL PERIODO DE EXPULSIÓN, LAS ARTERIAS Y VENAS SE RETRAEN A LA CAVIDAD ABDOMINAL SE TAPONAN CON LOS TROMBOS SANGUÍNEOS Y DE TODO EL CORDÓN UMBILICAL SOLO QUEDA LA VAGINA AMNIÓTICA.

CUIDADOS EN LA MADRE


LA MADRE SE ENCUENTRA GENERALMENTE MUY AGOTADA DESPUÉS DEL PARTO POR LO QUE REQUIERE UN CUIDADO MUY PARTICULAR. EN CASOS SOSPECHOSOS O DESPUÉS DE PARTOS DIFÍCILES ES RECOMENDABLE CONVENCERSE SOBRE EL ESTADO DE LOS ÓRGANOS REPRODUCTORES (PRESENCIA DE OTRO FETO, HERIDAS O PERFORACIONES UTERINAS Y VAGINALES, HEMORRAGIAS ETC) MEDIANTE EL EXAMEN VAGINAL.

CERVIX

ESTRUCTURA CARTILAGINOSA DE TRES ANILLOS QUE SIRVE COMO PUNTO DE REFERENCIA EN PALPACIÓN DEL APARATO REPRODUCTOR Y SIRVE PARA CONECTAR EL ÚTERO CON LA VAGINA.

EN LA GESTACIÓN SE PRODUCE UN GEL VISCOSO QUE SE CONOCE COMO TAPÓN DE WARTHOM QUE IMPIDE EL PASO DE GÉRMENES AL PRODUCTO O GESTACIÓN NUEVA. LA CERVIX ES UN ÓRGANO DE PAREDES GRUESAS, QUE ESTABLECE LA CONEXIÓN ENTRE LA VAGINA Y EL ÚTERO.

ESTÁ COMPUESTO DE TEJIDO CONECTIVO DENSO Y MÚSCULOS, Y SERÁ NUESTRA REFERENCIA AL INSEMINAR UNA VACA. LA ENTRADA A LA CERVIX ESTA PROYECTADA HACIA LA VULVA EN FORMA DE CONO. ESTO FORMA UN CÍRCULO CIEGO DE 360° QUE RODEA COMPLETAMENTE LA ENTRADA A LA CERVIX. ESTA BASE CIEGA DEL CONO ES CONOCIDA COMO FORNIX.



CERVIX BIFIDO:

UNA DE LA ANOMALÍAS ES EL CÉRVIX BÍFIDO TIENE DOS CONDUCTOS LOS CUALES PUEDEN SER O NO FUNCIONALES Y VAN A PRESENTAR DIFICULTADES AL PARTO IMPIDIENDO LA DILATACIÓN DE ESTE Y PASO DEL PRODUCTO (NEONATO).

Bibliografía

UDS. (s.f.). *fisiología de la reproducción* . UDS./ Recuperado el /07/07/2022