



Nombre de alumno: Filadelfo Domingo
Ruíz Hernández

Nombre del profesor: Ana Gabriela
Villafuerte

Nombre del trabajo: súper nota

Materia fisiología de la reproducción
animal

Grado: 3 A

Grupo: LMVZ

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 enero de 2022

EL PARTO

Fases del parto

Fase de dilatación: Las contracciones del útero hacen que el cuello uterino se dilate hasta permitir el paso del cuerpo del neonato. ...

Fase de expulsión: Las contracciones uterinas ayudan al descenso de la cabeza del neonato.

Fase de alumbramiento: Una vez que ha salido el neonato y después de una breve pausa vuelven las contracciones, de manera más suave, para expulsar la placenta y la bolsa que contenía al neonato



Cuidados De La Madre Y Del Recién Nacido

CUIDADOS EN EL NEONATO: se toman en cuenta 2 factores importantes para el estado de salud del ternero la respiración y el ombligo

CUIDADOS EN LA MADRE: a la hora del parto se encuentra generalmente muy agotada después del parto por lo que requiere un cuidado muy particular. después de partos difíciles es recomendable convencerse sobre el estado de los órganos reproductores



Puerperio

Involución uterina: El útero después del parto sufre modificaciones macroscópicas y microscópicas, hasta alcanzar las características de un útero no gestante, lo cual lleva de 30 a 45 días. Su peso y tamaño posparto disminuyen rápidamente como consecuencia de la atrofia de las fibras musculares; por necrosis de las carúnculas y por eliminación de líquido



Retención de la placenta

En el bovino las membranas fetales son expulsadas fisiológicamente dentro de las primeras 12 hrs. después del parto. La placenta se elimina durante las 12 horas siguientes al parto, la Retención de la placenta por más de 24 horas se considera una patología. La retención placentaria (RP) es una alteración frecuente del Puerperio



Distocia

La distocia se da cuando un mamífero gestante llega a término y en el momento del parto le es imposible la expulsión del feto. Esta incapacidad se da por diferentes causas, ya sean fetales, maternas o mecánicas. estas se clasifican por causas mediatas o inmediatas: Las mediatas son aquellas que se pueden prevenir al momento de servir la vaca; Las causas inmediatas son aquellas eventualidades que se presentan en el momento en que se inicia el proceso de parto




Resolución de distocia

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit voluptate velit esse".



Cervix

En la gestación se produce un gel viscoso que se conoce como tapón de Warthom que impide el paso de gérmenes al producto o gestación nueva. La Cervix es un órgano de paredes gruesas, que establece la conexión entre la Vagina y el Utero



Universidad del sureste. 2022

Antología de fisiología de la reproducción animal. Pdf

Recuperado el 07/07/22

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/1078bed99132cacc98008765373f82db-LC-LMV304-FISIOLOGIA%20DE%20LA%20REPRODUCCION%20ANIMAL>