



***Nombre del alumno: Fernando Morales Pérez***

***Profesor: Ana Gabriela Villafuerte***

***Materia: Fisiología de la reproducción 1***

***Trabajo: Super nota***

***Licenciatura: Medicina Veterinaria y zootecnia***


***Cuatrimestre: 3***

## PARTO

El parto es el proceso en el que una hembra expulsa el feto al final de la gestación.

La cual podemos decir que tiene 3 etapas o fases.

1. Dilatación del cérvix (2 a 3 horas)



2. Nacimiento del ternero



3. Expulsión de la placenta

Algunas cosas que podemos ver a vista propia son, el lado derecho a aumentado, la ubre se llena, la vulva esta enrojecida, el animal esta inquieto



Cuando la madre ya tiene a su cría debemos tomar en cuenta dos partes importantes la respiración y el ombligo, en el ganado vacuno el ombligo se rompe antes de terminar el periodo de expulsión, tenemos que desinfectar el ombligo del ternero.

Debemos estar al pendiente que este mame el calostro de la leche ya que es parte importante de la vida de ellos



Debemos también tener en observación a la madre, ella se encuentra muy agotada, debemos hacer exámenes vaginales, ver por las ubres, mantenerlas completamente limpias.

Después del parto el útero sufre modificaciones macroscópicas y microscópicas, vuelve a su tamaño normal.




Fig. 11-30. Útero de uma vaca com ovário e salpinge (preparação a fresco). Foto preparada por Dr. J. Maierl, Munique.

Fig. 11-31. Útero aberto de uma vaca com ovário e salpinge (preparação a fresco). Foto preparada por Dr. J. Maierl, Munique.



## RETENCION DE PLACENTA

En ganado bovino es común la retención placentaria, lo normal es que esta se expulse en las primeras 12 horas después del parto. Cuando esta tarda más de 24 horas se puede considerar patología , esta es consecuencia de falta de varios factores como son deficiencias de nutrimentales , deficiencia de trastornos hormonales , enfermedades infecciosas o algunas patologías asociadas a la gestación.



## DISTOCIA

Esto sucede cuando la vaca no puede parir, se le hace complicado, tiene diferentes factores, nosotros podemos intervenir, lo que se recomienda es estar al pendiente, no sacar al ternero por que podríamos provocar un desgarre vaginal o alguna otra desviación.

Pueden existir diferentes complicaciones en el parto, debemos estar o revisar todo el aparato reproductor, el cérvix, si este se encuentra dilatado.

