

**Medicamentos recomendables para la terapia inicial en la hipertensión**

	DIURETICOS TIAZIDICOS	BETA BLOQUEADORES	INHIBIDORES DE LA ECA	RECEPTORES BLOQUEADORES DE ANGIOTENSINA	BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO	ANTHIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO
<b>Comunes</b>	CLOROTIAZIDA, CLORTALIDONA, HIDROCLOROTIAZIDA, POLITIAZIDA, INDAPAMIDA, METOLAZONA, METOLAZONA	ATENOLOL, BETAXOLOL, BISOPROLOL, METOPROLOL, METOPROLOL RETARDADO, NADOLOL, PROPANOLOL, PROPANOLOL RETARDADO, TIMOLOL	BENZANEPRIL, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, FOSINOPRIL, LISINOPRIL, MOEXIPRIL, PERINDOPRIL, QUINAPRIL, RAMIPRIL, TRANDOLAPRIL	LOSARTAN, VALSARTAN, IRBESARTAN, CANDESARTAN, TELMISARTAN, EPROSARTAN, OLMESARTAN	DILTIAZEM, VAREPAMILO, AMLODIPINA, NIFEDIPINA, FELODIPINA, ISRADIPINA, NICARDIPINA, LACIDIPINA	METILDOPA, HIDRALAZINA, LABETALOL, NIFEDIPINA
<b>Dosis</b>	125-500(1), 12.5-25(1), 12.5- 50(1), 2-4(1), 1.25-2.5(1), 0.5- 1.0(1), 2.5-5(1)	25-100(1), 5-20 (1), 2.5-10 (1), 50-100 (1-2), 50-100(1), 40-120(1), 40-160(2), 60- 180(1), 20-40(2)	10-40(1-2), 25-100(2), 2.5- 40(1-2), 10-40(1), 10-40(1), 7.5-30(1), 4-8(1-2), 10- 40(1),2.5-20(1), 1.4(1)	25-100MG, 80-320MG, 150-300MG, 8-32MG, 20- 80MG, 400-800MG, 20- 40MG	180-360MG, 80-320MG, 2.5- 10MG, 10-60MG, 2.5-10MG, 2.5-10MG, 10- 40MG, 10-20MG	250-3.00, 50-300, 200- 1.200, 30-120
<b>Afectaciones</b>	HIPERCALCEMIA	DEPRESION, FALTA DE AIRE, TRANSTORNOS DE SUEÑO	TOS SECA, HIPERCLAMIA, FATIGA, MAREOS POR PA BAJA, DOLOR DE CABEZA, PERDIDA DEL SENTIDO DEL GUSTO	MAREOS, ANGIODEMA	ESTREÑIMIENTO, MAREOS, LATIDOS CARDIACOS RAPIDOS, FATIGA, ERUPCION CUTANEA, NAUSEAS, DOLOR DE CABEZA, ENROJECIMIENTO	CANSANCIO, DEBILIDAD, DOLOR DE CABEZA, NERVIOSISMO
<b>Toxicidad</b>	HIPOCALCEMIA	TRANSTORNOS DE LA CONDUCCION CARDIACA Y CAIDA DE LA RESISTENCIA VASCULAR PERIFERICA	HIPOTENSION, SHOCK CIRCULATORIO, ALTERACIONES ELECTROLITICAS, INSUFICIENCIA RENAL, HIPERVENTILACION, TAQUICARDIA, PALPITACIONES, BRADICARDIA, ANSIEDAD	HIPERPOTASEMIA	SHOCK SEVERO Y REFRACTARIO A LAS MEDIDAS DE SOSTEN CONVECIONALES, CON ELEVADA MORTALIDAD	MALFORMACIONES CONGENITAS EN LAS VIAS URINARIAS DEL FETO, PUEDEN CAUSAR LA MUERTE DEL BEBE POCO DESPUES DE MORIR
<b>Vía de administración</b>	VIA ORAL	VIA INTRAVENOSA	VIA ORAL	VIA ORAL	VIA INTRAVENOSA	VIA ORAL

## Antibióticos

	BETA LACTAMICOS	AMINOGLUCOSIDOS	LINCOSAMIDAS	POLIPEPTIDICOS	RIFAMICINAS	TETRACICLINAS	AMFENICOLES	MACROLIDOS	MISCELANEOS	QUIMIOTERAPICOS ANTIBACTERIANOS
Comunes	PENICILINAS, CEFALOSPORINAS, MONOBACTAMS, CARBAPENEMS	GENTAMICINA, AMIKACINA	CLINDAMICINA, LINCOMICINA	POLIMIXINA	RIFAMPICINA	TETRACICLINAS	CLORANFENICOL	ERITROMICINA, AZITROMICINA	ESPECTINOMICINA, VANCOMICINA, CICLOSERINA, FOSFOMICINA, NOVOBIOCINA, LIZENOLIDA	SULFONAMIDAS, TRIMETROPINAS, NITRUFANOS DERIVADOS, NAFTIRIDINA Y QUINOLANAS
Dosis	200.000-300.000 U. POR KG/DIA, 1-4g AL DIA, 1-2 G. AL DIA	2MGg/KG/DIA, 15 MG/KG/DIA	2-7 G/DIA, 10-20 MG/KG/DIA	1-2 GOTAS EN CADA OJO		TOMAR DE 2-4 VECES AL DIA	20 MG/KG	30-50 MG/KG/DIA, 10 MG/KG/DIA	2G, 15-20 MG/KG, 2-6 MG/KG/DIA, 500-1.00 MG, 250-500MG, 600MG C/12 HORAS	1 COMPRIMIDO POR C/4KG, 80-400 (2), 1-2 MG/KG, 400-500MG
Afectaciones	HIPERSENSIBILIDAD ERUPCION CUTANEA, URTICARIA, FIEBRE, VOMITOS	NAUSEAS, VOMITOS, DIARREA, DOLOR, DISMINUCION DE APETITO, FIEBRE	SABOR METALICO EN LA BOCA, DOLOR AL TRAGAR, ACIDEZ, DOLOR DE ARTICULACIONES, DIARREA PERSISTENTE, NAUSEAS, URTICARIA	ARDOR EN LOS OJOS, ENROJECIMIENTO, LAGRIMEO, IRRITACION	DECOLORACION TEMPORAL, PICAZON, SOMNOLENCIA, MAREOS	NAUSEAS, VOMITOS, DIARREA, PICAZON EN RECTO O VAGINA, INFLAMACION, GARGANTA IRRITADA	NAUSEAS, VOMITO, DIARREA, LLAGAS EN LENGUA Y BOCA, DOLOR DE CABEZA, DEPRESION, CONFUSION	MOLESTIAS ESTOMACALES, PERDIDA DE APETITO	NAUSEAS, DIARREA	SARPULLIDO, FIEBRE, PICAZON, ESCALOFRIOS, SANGRADOS, DIFICULTAD PARA RESPIRAR
Toxicidad	NEUROTIXICIDAD, INSUFICIENCIA RENAL,	OTOTOXICIDAD, NEFROTOXICIDAD, BLOQUEO NEUROMUSCULAR	TROMBOCITOPENIA, NEUTROPENIA, EOSINOFILIA, ESTOMATITIS, COLITIS SEUDOMEMBRANOSA	TOXICIDAD RENAL Y NEURONAL		REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD, SOBREINFECCIONES	TOXICIDAD DE LA SANGRE, SISTEMA LINFATICO, GASTROINTESTINAL	DESORDENES HEPATOBILIARES, CONVULSIONES	ESTOMATITIS, NEUROPATIAESTOMATITIS Y NEUROPATIA PERIFERICA	HIPOTIROIDISMO, HEPATITIS, REACTIVACION DE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
Vía de administración	ORAL Y PARENTERAL	PARENTERAL	PARENTERAL	OFTALMICA	ORAL	ORAL	INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR	ORAL	INTRAMUSCULAR Y ORAL	ORAL