

UDS

Comitan de
Domínguez chiapas a
17 de mayo del 2022

Nombre del alumno

Nelly

janeth

aguilar Escobedo

nombre del profesor

ing.

ana gabriela

villafuerte

materia

zootecnia de

bovinos

Grado y grupo

LMVZ

VI

"A"

introducción y razas de ganado

situación actual de la ganadería en México

La producción de ganado bovino se desarrolla bajo diferentes contextos agroclimáticos, tecnológicos y de manejo del ganado.

los sistemas ganaderos para producción de carne que destacan son el intensivo en corrales de engorda que representa 21.5% y el extensivo (engorda en praderas y agostaderos) que representa 78.5%

Estadísticas

Durante la década reciente la producción nacional de carne de bovino ha presentado un continuo crecimiento, con excepción de 2013

Problemas de la ganadería en México

Los productores agropecuarios, y los ganaderos en particular, enfrentan un conjunto de problemáticas tan amplio que sólo la necesidad de subsistir y la tenacidad campesina por no claudicar explican que aún se mantengan en la actividad.

alternativas

La intervención gubernamental debe estar dirigida a mejorar las condiciones de producción, Reestructuración de la Banca de Desarrollo para que sea funcional a la situación de los productores del campo, El gobierno debe promover un desarrollo tecnológico pertinente.

introducción y razas de ganado

sistemas de producción

En México, las actividades productivas se dan, en términos generales, bajo tres sistemas de producción, de acuerdo con el grado de inversión, de tecnología empleada, de capital utilizado, de fuerza de trabajo utilizada, de diferentes grados de integración, y de atención a diferentes mercados.

Los sistemas son: el tecnificado, el semitecnificado y el familiar, al que también le llegan a nombrar rural, periurbano. Asimismo, se presenta el de doble propósito.

taxonomía del bovino

Clase: Mamífero. Vertebrados superiores que al nacer maman, pelos en el cuerpo, Subclase: Euterios. Glándulas mamarias provistas de pezón, vivíparos placentados, Orden: Ungulados. Miembros terminados en pezuñas, terrestres, herbívoros Suborden: Artiodáctilos. Unguligrados de dos dedos, mamas inguinales. Grupo: Rumiantes. Estómago compuesto (poligástricos); doble masticación; tercer y cuarto hueso unidos formando la paña. Familia: Bóvidos. Cuernos nunca ramificados; sin incisivos superiores ni caninos. Subfamilia: Bovinos. Cola larga; hocico ancho, con morro desnudo y húmedo. Género. Bos Especie: Bos taurus, Bos indicus

edad según los dientes


Se basa en el estado de los dientes, aunque puede apreciarse también de acuerdo a las modificaciones de los cuernos. La fórmula dentaria del bovino es: $I = 0 / 8 + C = 0 / 0 + PM = 6 / 6 + M = 6 / 6 = 32$ dientes

edad según los cuernos

Nacimiento: Sin cuernos. - De 1,5 a 2 meses: Se manifiestan los pitones
A los 5 meses: empiezan a engrosar
Al año: cuernos formados, ásperos y escamosos. Un anillo
A los 2 años: Punta de asta con rugosidad córnea y esférica (bellota). Dos anillos.
A los 3 años: La punta se alisa; el resto sigue rugoso. Primer surco y nudo persistente.
A los 4 años: Todo el cuerno está pulimentado y brillante. Segundo anillo persistente.
A los 5 años: Tres anillos y así sucesivamente.

introducción y razas de ganado

principales razas de bovinos



Existen en el mundo unos 900 tipos de bovinos distribuidos en los 5 continentes. En muchas regiones las razas nativas utilizadas predominan, mientras que, en otros, los tipos comunes son de origen externo.


selección de las razas, por lo cual se deben escoger animales que se adapten fácilmente a la región y logren producciones rentables para el ganadero.

razas bovinas lecheras



raza holstein, raza jersey, raza pardo suizo, Raza ayrshire, raza montbeliarde, raza pizan, raza norman.

edad según los dientes



raza brahman, shortorn, santa gertrudis, charolais, hereford, aberdeen angus, simental, blanco azul belga