

UDS

**UNIVERSIDAD DEL
SURESTE**

MATERIA:

PATOLOGIA DEL ADULTO

DOCENTE:

MAURA DECKER RODRIGUEZ

ALUMNO:

J. CARLOS DE LOS SANTOS DE LA CRUZ

Problemas esofágicos

Enfermedad por reflujo gastro-esofágico	Cáncer de esófago
<p>Una sensación de ardor en el pecho (acidez estomacal), que suele darse después de comer y que puede ser peor a la noche</p> <p>Dolor en el pecho</p> <p>Dificultad para tragar</p> <p>Regurgitación de alimentos o de líquidos agrios</p> <p>Sensación de tener un nudo en la garganta</p> <p>TX:</p> <p>Antiácidos, Antagonistas H2, Inhibidores de bomba de protones,</p>	<p>Estos signos y síntomas tal vez se deban a un cáncer de esófago u otras afecciones. Consulte con su médico si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dolor o dificultad al tragar.• Pérdida de peso.• Dolor detrás del esternón.• Ronquera y tos.• Indigestión y acidez.• Una masa debajo de la piel. <p>TX:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cirugía para el cáncer de esófago.• Radioterapia para el cáncer de esófago.• Quimioterapia para el cáncer de esófago.• Medicamentos de terapia dirigida para el cáncer de esófago.• Inmunoterapia para el cáncer esófago.• Tratamientos endoscópicos para el cáncer de esófago

Problemas gástricos

GASTRITIS	ULCERAS GASTRICAS	CANCER DE ESTOMAGO
<p>Malestar o dolor punzante o ardor (indigestión) en la parte superior del abdomen que puede empeorar o mejorar cuando comes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Náuseas • Vómitos • Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen después de haber comido <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Medicamentos antibióticos para eliminar la <i>Helicobacter pylori</i>, Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la recuperación, Medicamentos para reducir la producción de ácido, Medicamentos que neutralizan el ácido estomacal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ocurre cuando el estómago está vacío, como entre comidas o durante la noche • se alivia brevemente si la persona come o si toma antiácidos • dura de minutos a horas • aparece y desaparece por varios días, semanas o meses <p>Algunos síntomas menos comunes podrían incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distensión abdominal • eructos • sensación de malestar estomacal • inapetencia • vómito • adelgazamiento <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Medicamentos antibióticos para eliminar el <i>helicobácter pylori</i>, Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la recuperación, Medicamentos para reducir la producción de ácido, Antiácidos que neutralizan el ácido estomacal, Medicamentos que protegen el revestimiento del estómago y el intestino delgado</p>	<p>Indigestión o acidez estomacal.</p> <p>Dolor o molestia en el abdomen.</p> <p>Náuseas y vómitos, especialmente vomitar los alimentos sólidos poco después de haberlos consumido.</p> <p>Diarrea o estreñimiento.</p> <p>Hinchazón del estómago después de las comidas.</p> <p>Pérdida del apetito. Sensación de que los alimentos se atorán en la garganta al comer.</p> <p>Debilidad y fatiga.</p> <p>Vómitos de sangre o sangre en la materia fecal.</p> <p>Pérdida de peso sin razón aparente.</p> <p style="text-align: center;">TX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirugía para el cáncer de estómago • Quimioterapia para el cáncer de estómago • Terapia dirigida contra el cáncer de estómago • Inmunoterapia para el cáncer estómago • Radioterapia para el cáncer de estómago

--	--	--

Problemas del tracto intestinal

COLITIS ULCEROSA	CANCER DE COLON	OSTOMIAS
<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea, a menudo con sangre o pus • Dolor y cólicos abdominales • Dolor en el recto • Sangrado rectal (presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces) • Necesidad imperiosa de defecar • Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia • Pérdida de peso • Fatiga • Fiebre • En el caso de los niños, retraso en el crecimiento <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Antiinflamatorio no esteroideo, Antibiótico, Antiinflamatorio, Inmunosupresor, Esteroide, Analgésico y Suplemento dietético</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en los hábitos intestinales (p. ej., diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces) que duren por varios días • Sensación de querer evacuar (ir al baño), la cual no se alivia al hacerlo • Sangrado rectal • Heces oscuras o sangre en las heces (aunque a menudo las heces se vean normales) • Calambres o dolor abdominal (vientre) • Debilidad y fatiga • Pérdida de peso no intencionada <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Los tratamientos más comunes incluyen la cirugía para extraer el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangrado del estomago • Cambio en el color del estómago, es decir, toma un aspecto negro. • Fiebre mayor de 38. 3º C • Dolor abdominal severo. • Salida de líquido alrededor del estomago • Presencia de masa alrededor del estomago • Diarrea que dura más de un día. <p style="text-align: center;">TX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En primer lugar, hay que dejar claro que una estoma no se cura, se limpia. La higiene se realiza con agua y jabón neutro, con una esponja suave. • La piel debe secarse suavemente, sin frotar. • Una vez esté limpia la zona y seca la piel periestomal, se puede proceder a colocar los nuevos colectores.

PROBLEMAS ABDOMINALES

ENFERMEDAD DIVERTICULAR	APENDICITIS AGUDA	HERNIAS
<ul style="list-style-type: none"> • Dolor, que puede ser constante y persistente durante varios días. El dolor se suele sentir en la parte inferior izquierda del abdomen. Sin embargo, a veces, el dolor puede ser más intenso en la parte inferior • Náuseas y vómitos. • Fiebre. • Sensibilidad abdominal. • Estreñimiento o, con menos frecuencia, diarrea. <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Generalmente no se necesita tratamiento, a menos que haya inflamación (diverticulitis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen. • Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y, a menudo, se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen. • Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos. • Náuseas y vómitos <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>La apendicitis suele tratarse con cirugía y antibióticos. Si no se trata, el apéndice puede reventarse y causar un absceso o una infección sistémica (sepsis).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Náuseas, vómitos o ambos. • Fiebre. • Dolor repentino que se intensifica rápidamente. • Un bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuro. • Incapacidad para evacuar el intestino o eliminar gases <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>El tratamiento incluye chequeos médicos para control. Si es necesario, una cirugía puede volver el tejido a su ubicación normal y cerrar la apertura</p>

PROBLEMAS DE RECTO Y AÑO

HEMORROIDES	FISURA ANAL	FISTULA ANALES
<ul style="list-style-type: none"> • Picazón o irritación en la zona anal. • Dolor o molestia. • Hinchazón alrededor del ano. • Sangrado. <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>Aplica cremas para hemorroides de venta libre o supositorios con hidrocortisona, o utiliza almohadillas con hamamelis o un agente anestésico. Sumérgete con frecuencia en una bañera con agua tibia o toma un baño de asiento. Sumerge la zona anal en agua tibia durante 10 a 15 minutos dos o tres veces al día.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación intestinal. • Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas. • Sangre roja brillante en las heces o en el papel higiénico luego de la evacuación intestinal. <p style="text-align: center;">TX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirugía colorrectal. • Cirugía de la mama. • Cirugía de las hemorroides. • Cirugía del suelo pelviano. • Cirugía endocrina y de la obesidad. • Cirugía esofágica y gastrointestinal. • Cirugía hepatobiliar y pancreática. • Cirugía de la pared abdominal. • Trasplante hepático. 	<ul style="list-style-type: none"> • Abscesos anales recurrentes • Dolor e hinchazón alrededor del ano • Dolor cuando se defeca • Hemorragia • Secreción con sangre o con mal olor (pus) de una apertura alrededor del ano. El dolor puede disminuir una vez que la fístula se drena. • Irritación de la piel alrededor del ano debido a las secreciones constantes • Fiebre, temblores, y una sensación generalizada de cansancio <p style="text-align: center;">TX:</p> <p>En los casos agudos se puede tratar con antibióticos inicialmente pero después será necesaria la cirugía.</p>