

ALUMNO: KARINA LISSETH GARCIA GARCIA.

PROFESOR: DR. MARIO ANTONIO CALDERÓN.

NOMBRE DEL TRABAJO: PATOLOGÍAS.

LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA.

MATERIA: PATOLOGÍA DEL ADULTO.

GRADO: 6TO CUATRIMESTRE.

GRUPO: "A" ESCOLARIZADO.

Hepatitis

Significa

Inflamación del hígado. Puede darse como efecto secundario por el contacto con sustancias químicas tóxicas, como el alcohol o las drogas.

Tipos

Hepatitis A

Es

Una inflamación del hígado debida a la infección por el virus de la hepatitis. Este virus se propaga principalmente cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada.

Síntomas

- Heces de color claro.
- orina oscura.
- Somnolencia.
- Fiebre.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Pérdida del apetito.
- Ictericia.

Hepatitis B

Se

Contrae a través del contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada.

Síntomas

- Mayor demora para que las hemorragias se detengan.
- inflamación del estómago o los tobillos.
- Formación de hematomas.


Hepatitis C

Es

causado por el virus de la hepatitis C. La hepatitis C puede variar desde una enfermedad leve que dura unas pocas semanas hasta una grave de por vida.

Factor de riesgo

- Compartir agujas u otros materiales de drogas.
- Perforación que no fueron esterilizadas.
- Tener relaciones sexuales sin protección.
- Tener contacto con sangre y heridas abiertas de una persona infectada.



Problemas biliares

Las

Causas más frecuentes de enfermedad del árbol biliar

Son

COLELITIASIS.

Es

La presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar. Predispone la obstrucción del flujo biliar e induce cólico biliar y colecistitis aguda o crónica. Su cuadro clínico puede presentar dolor en el hipocondrio derecho, intolerancia comida grasa, cólico biliar o colecistitis aguda.

Factores

Que contribuyen al desarrollo de la colelitiasis:

- Anomalías en la composición de la bilis.
- Extasía de la bilis.
- Inflamación de la vesícula biliar.

De riesgo bien definidos que se describen son:

- Edad.
- Sexo femenino.
- Obesidad.
- Historia familiar.

COLECISTITIS.

Es

La inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar. La colecistitis crónica es causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis aguda que producen un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis de la misma.

Su

Síntomas en más del 40% de los pacientes ancianos puede:

- No existir fiebre.
- Ni signos de irritación peritoneal.

Tratamiento inicial consiste en:

- Mantener la dieta absoluta.
- Reposición hidroelectrolítica.
- Uso de analgésicos y antibióticos.