



**Nombre de alumnos:**

**Paola Janeth Vilchis Gordillo**

**Nombre del profesor:**

**FELIPA ANTONIO MORALES  
HERNANDES**

**Nombre del trabajo: inhibidores**

**Materia: FARMACOLOGIA**

**Grado: 3 cuatrimestre**

**Grupo: B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 08 de JUNIO de 2022

TEJIDOS

clasificación

- ESPIRINOLACTONA
  - Inhiben competitivamente al receptor mineralo corticoides
- POSOLOGIA
  - Inhibidores al respecto de mineral corticoides
- eplerenona
  - Inhibe competitivamente al receptor de mineral corticoide
- triamterene
  - Es un neprotóxina potencial

Inhibidore

- Insuficiencia cardiaca
  - El bloqueo del receptor mineralocorticoide
- Daño hepático crónico
  - Inhibidores de la enzima concertidora de angiotencina
- Hiperaldoteromismo
  - Antagonista de los receptores

farmaco

- Nivel más bajo o las 24 horas
  - Relacionada la cantidad de bloqueo

Receptore s AT

- El grado de atracción por el receptor correcto
  - Losartan 1000 veces
  - Telmisortan 3000 veces
  - Irbesatan 8500 veces
  - Olmesartsan 12500 veces
  - valsatan 20000 veces

betabloqu eadores

- valsartan
    - 6 horas
  - Lasartan
    - 6-9 horas
  - libersatan
    - 11-13 horas
  - temisarta
    - 24 horas
  - olmasata
    - 13 horas
- Acebutold
  - Atenolol
  - Bisaprolol
  - Metopidor
  - Nadolol
  - propranol

