



**Nombre de alumno: César Eduardo  
Figueroa Moreno**

**Nombre del profesor: María Cecilia  
zamorano**

**Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico**

**Materia: Gerontología**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 6**

**Grupo: "A"**

Patologías frecuentes del sistema genito urinario

Las infecciones del sistema  
 urinario es considerado generalmente  
 como la existencia de microorganismos  
 patógenos en el tracto urinario con o  
 sin presencia de síntomas y/o signos  
 Bacteriano de lo es el más frecuente  
 (80% - 90%).  
 Seos es la escherichia coli  
 más frecuente de lo en ambos  
 ITU el agente etiológico más  
 to el responsable de la  
 otros, un nivel microorganismo  
 más ser de los

En esta prueba semicuantitativa

la detección de un organismo por  
 campo cuando existe de impureza tiene  
 una corrección aproximada con 10000  
 UFC/ml en el líquido, la presencia de  
 bacterias viables en el examen microscópico  
 de orina es menor o asistible (40-70%).  
 (hipersensibilización)

Procedimientos auxiliares

El estudio de sedimentación  
 urinario, a parte de nuestra  
 de estar obtenida del cuerpo  
 medio & micción (0.001M) es  
 positivo de manera leucocitos y  
 positivos así como hemáticos  
 que suelen observarse en 40  
 a 60% de los pacientes  
 el valor predictivo  
 positivo para una concentración  
 con de los UFC/ml es  
 88%. En vista esto los  
 cultivos y los microbio  
 los de orina cambian a  
 perspectiva diagnóstica  
 en tratamiento de mujeres  
 ITU sintomática aguda.