

Nombre del Alumno: Gilber Jovany Gonzalez Miguel

Nombre del tema: Mapa conceptual

Parcial: 2º

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernandez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6º

INSUFICIENCIA HEPATICA

Que provoca

Es la pérdida rápida (en días o semanas) de la función del hígado, por lo general en una persona que no presenta una enfermedad hepática preexistente

Su causa más común es un virus de la hepatitis o medicamentos, como el acetaminofén

Que es

Es un deterioro grave de la función hepática. La insuficiencia hepática es causada por un trastorno o una sustancia que daña el hígado. En la mayoría de los casos se presenta ictericia.

Otros síntomas incluyen la acumulación de líquido en el abdomen; ascitis

La insuficiencia hepática puede aparecer de manera repentina (aguda) o progresiva (crónica)

Como se detecta

Con pruebas funcionales hepáticas si tiene síntomas de una enfermedad del hígado, como: Ictericia: Causa un tono amarillento en la piel y los ojos, Náuseas y vómitos, Diarrea, Dolor abdominal, Orina oscura, Heces de color claro y Fatiga.

Los síntomas de la insuficiencia hepática son el color amarillento de la piel y los ojos (ictericia), junto con hinchazón y dolor en el vientre

Como corregir

Trasplante de hígado
Cuando la insuficiencia hepática aguda no se puede revertir, el único tratamiento puede ser un trasplante de hígado. Durante un trasplante de hígado, el cirujano extirpa el hígado dañado y lo reemplaza por el hígado sano de un donante

Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, cambios en la dieta o, en algunos casos, trasplante de hígado