



UNIVERSIDAD DE SURESTE
LICENCIATURA DE ENFERMERÍA
CAMPUS –COMITÁN

MATERIA:

Enfermería del adulto

NOMBRE DEL ALUMNO:

Fany yareni Hernandez Lopez

NOMBRE DEL PROFESOR:

Silvino Domínguez perez

NOMBRE DEL TRABAJO

Ensayo de fractura de base de cráneo

GRUPO

6 A

Comitán de Domínguez Chiapas ,9/6/22

FRACTURA DE BASE DE CRANEO

Fractura de craneo

Es la rotura de un hueso de la cabeza, la Fractura puede ir acompañada de lesiones Cerebrales o NO. La cual puede producirse por impactos importantes sobre la cabeza, produciendo lesiones de algunos nervios o vasos sanguíneos que atraviesan la base del craneo.

En las personas con una Fractura de craneo, la lesión cerebral puede ser más grave que en quienes han sufrido un traumatismo cerebral sin Fractura. La gravedad de una Fractura de craneo depende en parte del tipo y ubicación de la Fractura. En ocasiones los huesos del craneo se rompen pero permanecen en su lugar y el cerebro no se lesiona.

Algunas Fracturas craneales producen lesiones en los arterias y venas, que sangran en los espacios cercanos al tejido. La sangre puede acumularse en el cerebro y el craneo causando un hematoma intracraneal, ya sea que sea en el interior del encefalo.

Los síntomas.

Somnolencia y confuciones, Persistente o en aumento.

Dolor, Pérdida de equilibrio, Problema para hablar o ver.

Pérdida de líquido por la nariz y oídos.

Hematomas detrás de las orejas o alrededor de los

ojos, Falta de coordinación

convulsiones, Cefalea intensa, Vomito repetidos.

Para diagnosticarlos se realiza una Tomografía Computarizada. (Fractura de cráneo).

Tipos de Fractura

Fractura abierta: Son las que lesionan y habren la Piel.

Fractura cerrada: Lesiones que no rompen la piel.