

Fractura de base de Cráneo.

Se define como la fractura ósea que afecta a alguno de los huesos situados en el suelo o base de la cavidad craneal. Suele producirse por impactos importantes sobre la cabeza.

— Signos —

Independientemente de los signos propios de un traumatismo craneocefálico como conmoción cerebral, las fracturas de la base del cráneo provocan unos síntomas específicos que inducen a sospechar el diagnóstico y la localización de la fractura.

- **Equimosis periorbitaria.** Es el llamado signo del ojo panda o mapache se debe a una extravasación de la sangre en la región próxima a la órbita.

- **Hematoma en la apofisis mastoide.** Aparece como un hematoma detrás del pabellón auricular.

- **Otorragia.** o salida de sangre a través del conducto auditivo externo.

— Complicaciones. —

→ Rorrea de líquido cefalorraquídeo por lesión de las meninges que provoca salida de líquido cefalorraquídeo al exterior a través de la nariz.

→ Hipoacusia por lesión del nervio auditivo en la región del peñasco del hueso temporal.

→ Parálisis facial provocada por lesión del nervio facial en su recorrido por el conducto auditivo interno a través del peñasco del hueso temporal.

→ Anosmia por lesión del nervio olfatorio

→ Pérdida de visión por lesión del nervio óptico.

→ Lesión de la glándula hipofisiaria que desencadena la aparición de una diabetes insípida.

- Lesión de la arteria carótida interna a su paso por el conducto carotideo que puede provocar infarto cerebral
- Lesión del IX par craneal o nervio glossofaríngeo
- Lesión del IX par craneal o nervio hipogloso.

— Prevención. —

No todas las lesiones en la cabeza se pueden prevenir. Las siguientes medidas sencillas pueden ayudar a que usted y su familiares estén a salvo:

- Utilice siempre equipos de seguridad durante las actividades que podrían causar una herida en la cabeza. Esto incluye cinturones de seguridad, cascos de moto o de bicicleta y protectores para la cabeza.
- Aprenda y acate las recomendaciones de seguridad en la bicicleta.
- No tome si va a conducir. No permita que lo transporte alguien que puede haber estado bebiendo alcohol o que experimente algún otro tipo de alteración.

Consiga asistencia médica de inmediato si:

- Hay problemas con la respiración o la circulación.
- La presión directa no detiene el sangrado de la nariz, los oídos ni la herida.
- Hay secreción de líquido transparente de la nariz o los oídos.
- Hay inflamación, sangrado o hematomas en la cara
- Hay objetos sobresalientes en el cráneo.

Norma