



DOCENTE:

L.E JUANA INES HERNANDEZ LOPEZ

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA III

ALUMNO:

LITZI RUBÍ DE LA CRUZ DE LA CRUZ.

CUATRIMESTRE:

3 LEN GRUPO B

ACTIVIDAD 2
PROMOCIÓN A LA
SALUD FÍSICA

**ADMINISTRACIÓN
DE
MEDICAMENTOS
POR VÍA ORAL**

**PROCEDIMIENTO
POR EL CUAL
MEDICAMENTO POR
VÍA ORAL SE
ADMINISTRA O SE
REALIZA.**

Se introduce en el organismo a través de la boca y se absorbe en algún tramo del tracto digestivo ejemplo cuando se toma un medicamento podemos citar: Tabletas, cápsulas, elíxires, aceites, líquidos, suspensiones, polvos y granulados.

**MEDICAMENTOS
QUE SE PUEDEN
ADMINISTRAR POR
LA VÍA ORAL.**

son los comprimidos, cápsulas, grageas, jarabes, soluciones, suspensiones y granulados. Los comprimidos son la forma farmacéutica más empleada.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRADÉRMICA

Colocación de la vía intradérmica

El sitio para la administración de medicamentos intradérmicos, es la cara anterior del antebrazo, la parte anterior y superior del pecho, por debajo de la clavícula, parte superior de la espalda a la altura de las escapulas y la zona media del abdomen

Medicamentos que se pueden administrar en la vía intradérmica

introducir en la dermis una cantidad de medicamento no superior a 0,3 ml. La zona más usada para el uso de esta vía es la cara anterior del antebrazo.

Vacunas que se administran en la vía intradérmica

La vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin (BCG), ampliamente extendida en muchas partes del mundo, se realiza de forma rutinaria por vía intradérmica, la administración intradérmica de las vacunas de la hepatitis B, la rabia y la gri-10-16.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBCUTÁNEA

INYECCIÓN SUBCUTÁNEA (SC O SUBQ)

(SC o subQ) significa que se aplica en el tejido adiposo, justo bajo la piel.

TIPOS DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS

1. Insulina
2. Anticoagulantes
3. Fármacos para la fecundidad

zonas del cuerpo para aplicarse una inyección SC

- Brazos. Por lo menos 3 pulgadas por debajo del hombro y por encima del codo, en la parte lateral o posterior.
- Parte exterior de los muslos.
- Zona del vientre. Por debajo de las costillas y por encima de los huesos de la cadera, por lo menos a 2 pulgadas de distancia del ombligo.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA INTRAMUSCULAR

Administración vía intramuscular.

músculo en el área con los dedos pulgar e índice. Con firmeza, coloque la aguja en el músculo recto hacia arriba y abajo en un ángulo de 90 grados. Empuje el medicamento en el músculo. Retire la aguja en línea recta.

Quando se utiliza la vía intramuscular

La vía intramuscular (IM) es utilizada en el medio sanitario para la administración de fármacos, sobre todo en el entorno de urgencias.

Medicamentos que se aplican.

se emplea para la administración de:
Algunos analgésicos o anti-inflamatorios no esteroideos (AINES)

**ADMINISTRACIÓN
DE
MEDICAMENTOS
POR VÍA
INTRAVENOSA**

**FÁRMACOS POR
VÍA INTRAVENOSA**

Conjunto de actividades encaminadas a suministrar fármacos intravenosos sin diluir o poco diluidos en el torrente sanguíneo.

**MEDICAMENTOS
QUE SE
ADMINISTRAN POR
LA VÍA
INTRAVENOSA.**

1. HALOPERIDOL
2. HEPARINA SÓDICA
3. HIDROCORTISONA
4. INSULINA RÁPIDA