

EVENTO CEREBRO VASCULAR

REPRESENTA UNA ENTIDAD AGUDA DE OBSTRUCCIÓN AL FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL YA SEA DE ORIGEN TROMBÓTICO O EMBÓLICO, SE CARACTERIZA POR SU ALTA MORBI-MORTALIDAD Y POSEE MANIFESTACIONES CLÍNICAS AMPLIAS SEGÚN LA TOPOGRAFÍA DE LA ANTERIA AFECTADA.

FISIOPATOLOGIA

Para mantener adecuado aporte de oxígeno - glucosa al tejido cerebral es necesario mantener un flujo sanguíneo cerebral (FSC) constante y adecuada para que eso sea necesario y pueda lograrse el rango de la presión arterial media se mantenga entre 60 y 150 mmHg.

FACTORES DE

RIESGO

Los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables, siendo los modificables su mayoría. Dentro de los no modificables, la edad correspondiente al factor de riesgo de mayor peso y de los modificables, la hipertensión arterial como el factor asociado con mayor prevalencia.

CLASIFICACIÓN

ICTUS TOTAL DE LA CIRCULACIÓN ANTERIOR (TACI).
ICTUS PARCIAL DE LA CIRCULACIÓN ANTERIOR (PACI).
ICTUS DE LA CIRCULACIÓN POSTERIOR (POCI).
INFARTO CEREBRAL LACUNAR (LACI).

DIAGNOSTICO

Todo paciente debe contar con una neuroimagen para confirmar el diagnóstico y valorar complicaciones, y la TAC es el estudio de elección para iniciar con el diagnóstico.

TRATAMIENTO

Tratamiento farmacológico
Tratamiento endovascular

El tratamiento se puede considerar en las primeras 6 hrs de iniciado el cuadro clínico.

ARTERIOSCLEROSIS

Y

ALZHEIMER

¿Qué es?

El Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

La enfermedad puede causar que una persona se confunda, se pierda en lugares conocidos, extravíe las cosas o tenga problemas con el lenguaje.

TIPOS

Demencia Vascular - Demencia Mixta - Demencia de la enfermedad de Parkinson - Demencia con cuerpos de Lewy - Demencia Frontotemporal - Demencia del Síndrome de Down - etc.

FACTORES DE RIESGO

La edad, antecedentes familiares y la genética son factores de riesgo que no podemos cambiar.

¿Qué es?

La arteriosclerosis es la forma más común de enfermedad cardiovascular.

FACTOR DE RIESGO

Los factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión, la diabetes y el tabaco, actúan como verdaderos estímulos proinflamatorios capaces de lesionar el normal funcionamiento de la pared vascular.

PREVENCIÓN

Consigue evitar o retrasar el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica.

TRATAMIENTO

El mejor tratamiento es la prevención actuando tempranamente sobre los factores de riesgo cardiovascular.