

UNIVERSIDAD DE SURESTE
LICENCIATURA DE ENFERMERIA
CAMPUS - COMITAN

MATERIA: Patología del Adulto

NOMBRE DE ALUMNO: Ciclati Vera Osorio

NOMBRE DE PROFESOR: Felipe Morales

NOMBRE DE TRABAJO: Mapa Conceptual

GRUPO: "B" GRADO: 6

INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA.

DEFINICIÓN

El término IHA se introdujo en 1970 para describir una entidad muy específica caracterizada por el deterioro agudo de la función hepática.

Los criterios globales para IHA son:

- Ausencia de enfermedad hepática crónica.
- Hapatitis aguda (elevación de AGT/ALT) junto con elevación de INR > 1.5 .
- Alteración del estado de alerta (encefalopatía) duración de la enfermedad ≤ 6 semanas.

Etiología

La etiología de la IHA varía de acuerdo con la serie reportada y no es evolucionado al paso del tiempo.

Declarativa en

- Anti-epilépticos
- Anti-tuberculosos
- Antibióticos
- Estatinas
- Nifedipina

Fisiopatología

La fisiopatología de la IHA es compleja pero está en estrecha relación con la necrosis y/o apoptosis.

Síndrome de IHA los siguientes son fundamentales

- Cardiovascular.
- Neurológico
- Renal
- Disfunción inmune y sepsis.
- Coagulación
- Oncológico

Diagnóstico

El diagnóstico de IHA requiere de un elevado índice de sospecha, el reconocimiento del dispareja y su correlación con los manifestaciones clínicas orientan a un diagnóstico temprano y oportuno.

Tratamiento

El tratamiento de la IHA debe realizarse en una UTI.

