



**Nombre de alumno: ESTEBAN
CONTRERAS HUERTA.**

**Nombre del profesor: FELIPE MORALES
HERNANDEZ.**

Nombre del trabajo: SUPER NOTA

Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO.

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6° CUATRIMESTRE

Grupo: B


Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de julio de 2022.

Artritis reumatoide en el paciente mayor

Enfermedad crónica, multisistémica, progresiva
Que se caracteriza por sinovitis destructiva y en algunas ocasiones manifestaciones extraarticulares.



Factores genéticos y ambientales tienen un porcentaje alto dentro del origen de la enfermedad.



ARTRITIS REUMATOIDE

Esta enfermedad presenta mayor incidencia entre los 30 y 60 años.

Signos de alerta:

Hinchazón	Rigidez por periodos de tiempo largos	Reducción en el rango de movimiento en los muñecas y rodillas
-----------	---------------------------------------	---

La AR puede permanecer por largos años y suele afectar diferentes partes del cuerpo incluidos, cartílagos, huesos, tendones y ligamentos.

70% de los casos se registran en el género femenino.

Prevalencia del género masculino comparado con inicio más temprano en relación hombre: mujer 1:3 alrededor de la 5ta década de la vida y 1.2:2.2 después de los 65 años de edad



Factores genéticos el HLA antígeno leucocitario Humano clase II locus DR B1 dentro de los subtipos de este locus se ha observado una mayor incidencia del DR B1*04 en pacientes con ARpm comparado con los Pacientes con ARPM en donde se ha observado más el DRB1*014) ha demostrado su presencia en un porcentaje alto en los pacientes con AR,





Manifestaciones extraarticulares. Otro gen que se ha visto implicado es el PTPN22, el cual ha demostrado un riesgo de 1.5-2 veces más de desarrollar la enfermedad en portadores de este gen. En lo que respecta a factores ambientales.



Durante la exploración física, el médico revisará las articulaciones para detectar hinchazón, enrojecimiento y temperatura. El médico también puede evaluar tus reflejos y fuerza muscular. **globular (VSG)**



Medicamentos antiinflamatorios no esteroides
 Medicamentos antiinflamatorios no esteroides de venta libre incluyen ibuprofeno Advil, Motrin IB, otros y naproxeno sódico Aleve.
Esteroides. Los medicamentos corticosteroides, como la prednisona, reducen la inflamación y el dolor, y retrasan el daño articular

Bibliografía: artículo de AR Jorge Alberto Barragán Garfias* 1. R asch EK, Hirsch R, Paulose-Ram R et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in persons 60 years of age and older in the United States. *Arthritis Rheum* 2003; 48: 917-926.
 2. L aiho K, Tuomilehto J, Tilvis R. Prevalence of rheumatoid arthritis and musculoskeletal diseases in the elderly population. *Rheumatol* 1994; 33: 65-67