## EUDS Mi Universidad

Nombre del Alumno: Nelsi Beatriz Morales Gómez

Parcial: 2°

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6°



	CONCEPTO (la insuficiencia hépatica aguda lina) es una enfermedad moltior- grave daño hépatica.
Schillary.	DEFINICIÓN Especifica caracterizada por el deterioro agodo de la fonción herática en un lapao de achamate normal que evolucionale
To start	clestaca la de O'Grady que de accerdo con los caracteristicas de las que MO fiscas la resión hepatica en hiperando como la como de las que
Insuficiencia Hepatica Aquada	PESIOPATOLOGIA Pero está en estriccha reloción con la cerebral, despolarización mitocondral molecula resolución de las hepato— y roptora de membrosa mitocondral
Seption 1	vación del mor con activación de coma- caspasas, condensación de coma- ción de agradoción del pue y replac
	Requiere de un elevado indice de saspedra; el reconocimiento del disparador y su correlación con las manifestaciones clínicas orientan a un diagnóstico temprono y oportuno pecha diagnóstica.
	El trafamiento de las Facientes con una debe iniciarse demanera temprana y oportuna una vez analizadas con detenimiento las fallas organicas y alteraciones fisiopatológicas que presente el enfermo.
	TRASPLANTE El trasplante heratico ortotópico, ya sea de cadaver o de donador vivo relacionado, es el único procedimiento que asegura un incremento significativo en la sobrevivencia en los focientes que desarrollan IHA.
	- 1914 secundaria (La 1144 inducida por Paracelama) es la calcula formacológica más Por Paracelamo (comúnmente reportado, representa hasta 394 de los casos) en algunos series.

UNIVERSIDAD DEL SURESTE