



**Nombre del alumno: Verónica Anahí López Aguilar**

**Nombre del profesor: María del Carmen López silba**

**Nombre del trabajo: Mapa conceptual**

**Materia: Practica Profesionales**

**Grado: 9° Cuatrimestre**

**Grupo: "A"**

# ESTADO GRAVE O CRÍTICO, DE COMA Y SHOCK

## Tipos de shock

### Estado de shock

Es

Esto

El shock es un síndrome

Provoca

Ya que

Una

Se caracteriza por la incapacidad

hipoxia tisular y fallo metabólico celular

Del

Con un

corazón o la circulación periférica

bajo flujo sanguíneo, o por una distribución irregular

Para

Esto

mantener una perfusión adecuada

Incluye un conjunto de síntomas, signos

Y

Los órganos vitales

alteraciones analíticas y hemodinámicas

Ya

Que precisan una rápida identificación y tratamiento agresivo

### Shock anafiláctico

Es la

Reacción sistémica de hipersensibilidad

De

carácter grave y a veces mortal

Con

la exposición a una sustancia sensibilizante

O

un fármaco, una vacuna, ciertos alimentos

Y

Pueden desarrollarse

Aun

Plazo de segundos desde el momento de la exposición

### Shock cardiogénico

Se

relaciona con un bajo gasto cardíaco

O

También conocida como falla de bomba

Y

Está asociada al infarto agudo de miocardio

Y

la insuficiencia cardíaca congestiva

Y

Las arritmias graves

Esta

elevada mortalidad, alrededor del 70%.

### Shock hipovolémico

Es

Una pérdida rápida y masiva de la volemia

Y

Acompañada a una gran variedad de trastornos

Y

Pueden ser médicos y/o quirúrgicos

O

Como traumatismos, hemorragias digestivas

Y

ginecológicas y patología vascular.

### Shock Séptico

Es

Hipotensión arterial debida a la sepsis

Y

la expansión del volumen con líquidos intravasculares

Y

acompañada de alteraciones de la perfusión

Que

requiere de fármacos vaso activos

Para

mantener la presión arterial.

## Bibliografía

UDS.ANTOLOGIAS.2022.ANTOLOGIA DE PRACTICAS PROFECIONALES.UTILIZADA EL 08 DE JUNIO DE 2022.PDF