

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

NOMBRE DEL ALUMNO:

ADRIÁN GUADALUPE DÍAZ ÁLVAREZ

LICENCIATURA:

ENFERMERÍA

MATERIA:

ENFERMERÍA DEL ADULTO

UNIDAD:

IV

PROFESORA:

LIC. GUADALUPE CRISTAL RIVERA ARIAS

ACTIVIDAD:

SÚPER NOTAS: MICOSIS Y TÉTANO



MICOSIS

MICOSIS

- Infecciones en la superficie del cuerpo.
- Son originadas por los hongos, pueden ser muy persistentes si no son bien tratadas, es decir cualquier infección causada por hongos a nivel cutáneo.



TIPOS DE MICOSIS:

- ❖ **Onicomiosis distal y lateral subungueal.** Es el patrón más frecuente. La infección comienza por el borde lateral o libre de la uña.
- ❖ **Onicomiosis blanca y negra subungueal superficial.** El hongo afectó toda la uña, pero superficialmente, sin llegar a las capas más profundas.
- ❖ **Onicomiosis blanca subungueal proximal.** Empieza por el borde próximo a la corte y la matriz y el crecimiento de la uña nueva.
- ❖ **Onicomiosis distrófica total.** Como resultado de una evolución de la onicomiosis anterior.
- ❖ **Dermatofitosis del cuerpo.** Denominado tiña corporal.
- ❖ **Dermatofitosis del cuero cabelludo.** Denominado tiña del cuero cabelludo.
- ❖ **Pie de atleta:** Provoca un resquebrajamiento y dolor ubicada entre los dedos de los pies.



SIGNOS Y SINTOMAS



PREVENCIÓN

TRATAMIENTO


Dependiendo de la forma clínica y de la extensión de las lesiones se indica tratamiento local o sistémico. Generalmente se utilizan derivados del imidazol como:

- o Miconazol
- o Ketoconazol
- o Terbinafina
- o Amorolfina



DIAGNOSTICO


- Un examen directo de las escamas cutáneas o pelos para saber si el agente causal es un dermatofito o una levadura.
- Para determinar con exactitud el hongo responsable es necesario realizar un cultivo de las lesiones.



- Evitar andar descalzo en lugares públicos y húmedos como piletas, duchas, gimnasios y vestuarios



- Cambiar de medias varias veces en el día, evitando el calzado de materiales sintéticos



- Secar bien la piel, especialmente en zonas con pliegues y entre los dedos de los pies



- Utilizar talcos o desodorantes que eviten la humedad y la sudoración excesiva. Airear esas zonas con frecuencia



- Utilizar ropa interior de algodón, evitando las fibras sintéticas



- En caso de lesión sospechosa, evitar automedicarse y buscar consejo médico. Un tratamiento equivocado puede complicar la curación




- No compartir toalla, peine, ni esponja con otra persona

TÉTANO

TÉTANO:

- Infección del sistema nervioso con un tipo de bacteria que es potencialmente mortal. Las bacterias suelen ingresar al cuerpo a través de un corte profundo, como los que ocurren cuando uno pisa un clavo, o a través de una quemadura.
- La bacteria vive en el suelo, la saliva, el polvo y en el estiércol.



PREVENCIÓN

Las personas de todas las edades necesitan la

VACUNA CONTRA EL TÉTANOS

DTaP para niños pequeños	Tdap para preadolescentes	Td o Tdap para adultos
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 2, 4 y 6 meses ✓ Entre los 15 y 18 meses ✓ Entre los 4 y 6 años 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entre los 11 y 12 años 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cada 10 años

www.cdc.gov/tetanus

SIGNOS Y SINTOMAS

- Espasmos leves en músculos de mandíbula.
- Dolor en tórax, espalda, cuello y músculos abdominales.
- Problemas respiratorios.



Trismo

Dolor y rigidez muscular

Lumbalgia

Disfagia

FACTORES DE RIESGO

- No vacunarse o no seguir el cronograma de vacunas de refuerzo contra el tétanos.
- Una lesión que deja esporas de tétanos en la herida.
- Un objeto extraño, como un clavo o una astilla.
- Heridas quirúrgicas.
- Úlceras infectadas en los pies.
- Infecciones dentales.
- Heridas punzantes, entre ellas astillas, perforaciones corporales (piercings), tatuajes, uso de drogas intravenosas.



TRATAMIENTO

- Antibióticos
- Reposo
- Medicamentos neutralizadores del toxico
- Relajantes musculares
- Sedantes
- Cx



CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- o Asegurar una vigilancia de enfermería intensiva.
- o Enseñar a la familia los signos de gravedad y pedirles que avisen al personal de enfermería si aparecen síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, apnea, secreciones abundantes, cianosis).
- o Aspiración suave de las secreciones (nariz, orofaringe).
- o Poner una sonda gástrica: hidratación, alimentación, medicamentos orales.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/micosis-superficiales-dermatofiticas#:~:text=Las%20micosis%20son%20afecciones%20cut%C3%A1neas,el%20fen%C3%B3meno%20de%20la%20fotos%C3%ADntesis.>

