NOMBRE DE LA ALUMNA:

YAQUELIN MONSERRAT LÓPEZ PÉREZ

NOMBRE DEL PROFESOR:

LIC. RUBEN EDUARDO DOMINGUEZ

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

GRADO: 9º CUATRIMESTRE GRUPO: “B”

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS A 14 DE MAYO DEL 2022.

ELEMENTOS DE ANATOMIA GENERAL Y TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA Y SU TERMINOLOGIA.

ANATOMIA TOPOGRAFICA**.**

Comprende el estudio de los segmentos corporales, dividiendo al cuerpo en regiones delimitadas por los relieves corporales óseos.

La anatomía topográfica divide el cuerpo humano en tres zonas principales: Cabeza , tronco y extremidades que, a su vez, estas son subdivididas en porciones más pequeñas denominadas regiones anatómicas.

Regiones de la Cabeza

La cabeza es la parte superior del cuerpo humano, se divide en el Cráneo

- región occipitofrontal
- la región temporal
- la Región mastoidea ,
- la región superciliar y de los senos frontales
- y la región de la base del cráneo.

Abdomen

es la parte inferior del tronco a la que se hallan unidas las otras dos extremidades, las inferiores o piernas.

- la región ocular.
- la región auricular o región ótica
- la región nasal.
- Región geniana o región bucal
- Región mase terina
- la Región labial6
- la región de la barbilla.

EL ESQUELETO

es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura.

En el adulto consta de 206 huesos articulados entre sí y estrechamente unidos a ligamentos, tendones, y músculos.

El sistema esquelético tiene varias funciones

- Sostén mecánico y mantenimiento postural
- Almacén metabólico
- Producción de células sanguíneas:
- Movimiento
- Protección

COMPSICION DEL TRONCO

Columna vertebral

Las vértebras que forman la columna vertebral son 33, agrupadas en 5 regiones.
- cervical: 7 vértebras
- dorsal: 12 vértebras
- lumbar: 5 vértebras
- sacra: 5 vértebras
- coccígea: 4 vértebras estas están fusionadas (pegadas)

Huesos de la pelvis

La pelvis se divide en dos regiones anatómicas diferentes entre sí, estas son la cintura pélvica y la columna vertebral a nivel de la pelvis.

¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA?

ESCALAS DE VALORACIÓN

Ramsay

La escala de Ramsay es una escala subjetiva utilizada para medir el nivel de sedación en pacientes, con el objetivo de evitar la sedación insuficiente o excesiva.

Silverman

La escala de Silverman (William Silverman y Dorithy Andersen 1956) es muy utilizada en las UCINs para valorar la gravedad de afectaciones respiratorias, concretamente el síndrome de distrés Respiratorio**.**

Eva

La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores.

Capurro

El test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada..

Apgar

La puntuación de Apgar es una prueba para evaluar a recién nacidos poco después de su nacimiento. Esta prueba evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, su tono muscular y otros signos para determinar si necesita ayuda médica adicional o de emergencia.

Braden

Medición del riesgo de padecer una úlcera por presión, a través de una escala validada.