



**Mi Universidad**

**MAPA CONCEPTUAL**

**NOMBRE DEL ALUMNO: MELIDA YADIRA VELAZQUEZ  
GONZALEZ**

**TEMA: CAPITULO IV**

**PARCIAL: 1° MODULO**

**MATERIA: TALLER DE ELABORACION DE TESIS**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ERVIN SILVESTRE CASTILLO**

**LICENCIATURA: LIC. ENFERMERIA**

**CUATRIMESTRE: 9° "B"**

*Frontera Comalapa Chiapas, a 14 de junio del año 2022.*

## **CAPÍTULO IV: RESULTADOS**

### **4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARCO METODOLOGICO**

El día Jueves 19 de Mayo del año en curso se realizó la aplicación de las encuestas y fichas de observaciones a las personas previstas de acuerdo a la muestra establecida. La muestra utilizada fue de 15 personas que se encontraban disponibles en el Ejido Santo Domingo La Cascada, Municipio de Siltepec, Chiapas.

La encuesta se llevó a cabo en un promedio de 4 horas por parte de los tesisistas profesionales de Enfermería del 9° cuatrimestre, modalidad semiescolarizada de la Universidad del Sureste, Campus de la Frontera.

Cabe destacar que el proceso de investigación se llevó a cabo de manera satisfactoria obteniendo los resultados de la participación deseada.


En el siguiente apartado se presenta los resultados a través de graficas que nos permitieron realizar un análisis e interpretación de la información para conocer la situación que prevalece respecto al prevención del cáncer de próstata en hombres de 35 a 40 años del Ejido Santo Domingo La Cascada, Municipio de Siltepec, Chiapas, que a su vez fue la base para la construcción de las recomendaciones y propuestas.

## 4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

**TABLA 1: DATOS PERSONALES**

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
EDAD	35-40	11	73%
	41-45	4	27%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
OCUPACIÓN	CAMPSESINO	14	93%
	PROFESIONISTA	1	7%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	10	67%
	SECUNDARIA	2	13%
	PREPARATORIA	2	13%
	UNIVERSIDAD	1	7%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

## GRÁFICA 1



**ANÁLISIS:** La grafica presentada nos muestra que el 73% de la población encuestada corresponde a personas de 35 a 40 años de edad, mientras que el 27% son personas de 40 a 45 años de edad.

**INTERPRETACIÓN:** La información obtenida de esta variable indica que la mayoría de las personas encuestadas están entre las edades de 35 a 40 años de edad, lo que se relaciona con el riesgo de padecer cáncer de próstata, ya que la edad es un factor determinante para esta patología.


## GRÁFICA 2



**ANÁLISIS:** La grafica que se presenta arriba nos revela los porcentajes de la variable ocupación. Nos damos cuenta que casi en su totalidad, específicamente con el 93% se dedica a las labores del campo, es decir son campesinos y solamente un 7% es profesionista.

**INTERPRETACIÓN:** La ocupación es una de las variables más importantes dentro de la investigación, ya que los hombres encargados del campo por sus actividades diarias tienen menos tiempo de acudir a algún centro de salud o a escuchar pláticas de prevención del Cáncer prostático, además también son los que menos toman conciencia de la importancia de la prevención.

### GRÁFICA 3




**ANÁLISIS:** La grafica presentada nos muestra que el 67% cuenta con el nivel primaria y el resto con un 13% cuentan con el nivel básico de secundaria y de igual forma con el mismo porcentaje los que tienen preparatoria y solo una persona que corresponde al 7% tiene el grado universitario.

**INTERPRETACIÓN:** En la gráfica de arriba se puede notar que la mayoría de las personas de la muestra cuentan por lo menos con primaria terminada, lo que nos ayuda a que las personas conozcan las medidas preventivas del cáncer cervicouterino. Pero hay que tomar en cuenta que el dato obtenido a aunque tengan un nivel considerable de estudios, muchas veces no poseen información sobre medidas preventivas de esta patología.

**TABLA 2: DATOS DE CONOCIMIENTO**

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CONCEPTO DE CÁNCER DE PRÓSTATA	SI	7	60%
	NO	8	40%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
CAUSAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	SI	3	80%
	NO	12	20%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
SIGNOS Y SINTOMAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	SI	4	87%
	NO	11	13%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	SI	2	33%
	NO	13	67%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
INFORMACION SOBRE PREVENCIÓN DEL CA DE PRÓSTATA	SI	4	47%
	NO	11	53%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
CONOCIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS	SI	3	87%
	NO	12	13%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
CONOCIMIENTO DEL ANTÍGENO PRÓSTATICO	SI	3	67%
	NO	12	33%
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

**GRÁFICA 4**




**ANÁLISIS:** La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 53% no conoce el concepto de cáncer de próstata y el 47% si conoce el concepto de esta patología.

**INTERPRETACIÓN:** En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no conoce el concepto de cáncer prostático, pero si han escuchado este término y solo menos de la mitad si conoce el concepto, lo que nos indica que para nuestra investigación quizás sea tan necesaria la promoción de las medidas preventivas con la minoría de la población, pero si con el otro grupo que desconoce la patología.




**GRÁFICA 5**



**ANÁLISIS:** La grafica de arriba nos muestra la variable conocimiento de las causas del cáncer de próstata y como resultado el 80% de la muestra encuestada no conoce las causas y solo un 20% si las conoce.

**INTERPRETACIÓN:** En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no conoce las causas de dicha patología y solo una mínima cantidad las conoce. Esto nos indica que dentro de la investigación fue prudente llevar a cabo la promoción de las medidas preventivas para esta enfermedad y reducir el riesgo de padecerla en un futuro.


## GRÁFICA 6



**ANÁLISIS:** La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 73% no conoce e identifica los signos y síntomas que pueden aparecer en el cáncer de próstata, pero un 27% que es considerable si conoce la forma clínica de este fenómeno.

**INTERPRETACIÓN:** Las manifestaciones clínicas del cáncer de próstata son un punto clave en el proceso de investigación, ya que la mayoría de la población encuestada respondió que no las conoce y que incluso nunca ha visto personas con esta enfermedad y una mínima parte si conoce de este cuadro; lo que nos hace pensar que es importante brindar información sobre el fenómeno ya que como todos sabemos esta patología presenta signos y síntomas y sería bueno que aprendieran a identificarlos.


## GRÁFICA 7



**ANÁLISIS:** El 87% de toda la muestra que se encuestó representa a los que no saben cuáles son los métodos para diagnosticar si una persona tiene cáncer de próstata y solo el 13% si las conoce.

**INTERPRETACIÓN:** En esta gráfica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no conocen los métodos o las formas de diagnosticar el cáncer prostático y eso nos puede aumentar los factores de riesgo de padecerla, sin embargo, hay que seguir haciendo énfasis en ese porcentaje considerable sobre la importancia de conocer los métodos diagnósticos para esta patología.

## GRÁFICA 8



**ANÁLISIS:** En la gráfica presentada se observa claramente que el 73% de la muestra encuestada no tiene información sobre las medidas preventivas del cáncer de próstata, mientras que con mucha diferencia y con un 27% se encuentran las personas que sí tienen información.

**INTERPRETACIÓN:** En la presentación de la tabla anterior se observa claramente la desigualdad en cuanto a porcentaje entre las personas que sí tienen información sobre el cáncer prostático y las que no la tienen y por eso mismo se debe seguir insistiendo en dar la información de la forma que sea a las personas sobre las medidas a tomar para prevenir este problema de salud en la población masculina.

## GRÁFICA 9



**ANÁLISIS:** En la gráfica presentada se observa claramente que el 80% de la muestra encuestada no tiene conocimiento sobre las medidas preventivas del cáncer de próstata, mientras que con mucha diferencia y con un 20% se encuentran las personas que si tienen estos conocimientos.

**INTERPRETACIÓN:** En la presentación de la tabla anterior se observa claramente la desigualdad en cuanto a porcentaje entre las personas que no tienen conocimiento sobre el cáncer cervicouterino y las que si la tienen y por eso mismo se debe seguir insistiendo en dar la información de la forma que sea a las personas sobre las medidas a tomar para prevenir este problema de salud.


**GRÁFICA 10**



**ANÁLISIS:** La grafica anterior muestra como un 80% de la población no conoce que es la prueba del antígeno prostático, pero al menos un 20% si lo conoce o por lo menos lo ha escuchado.

**INTERPRETACIÓN:** La variable concepto de antígeno prostático es la que se presenta en la gráfica de arriba y definitivamente casi todos los hombres encuestados no saben que es la prueba del antígeno prostático, por lo que es un punto en contra ya que como investigadores fue necesario llevar a cabo actividades para brindar dicha información y de esta manera reducir el riesgo de padecer este tipo de cáncer.

**GRÁFICA 11**



**ANÁLISIS:** En la tabla presentada arriba se puede observar como el 67% de los encuestados si se han realizado algún estudio de la próstata, pero la mayoría por método diferente al antígeno prostático y un 33% nunca se ha realizado esta prueba.

**INTERPRETACIÓN:** La variable realización de estudios de próstata es la que se presenta en la gráfica de arriba y definitivamente la mayoría de los hombres encuestados si se han realizado alguna vez estas pruebas, pero es importante mencionar que no a través del antígeno prostático, si no por otros métodos como el tacto rectal, lo que nos lleva a concluir que es necesario trabajar en proporcionar información a los hombres sobre la prueba con el antígeno.

## GRÁFICA 12




**ANÁLISIS:** La imagen de arriba muestra los resultados de la variable realización del estudio del antígeno prostático en el último año y definitivamente el 60% de los hombres en estudio no se han hecho este estudio en los últimos 12 meses mientras que el 40% si se lo ha realizado por motivos diferentes.

**INTERPRETACIÓN:** La variable presentada anteriormente y demostrada en la gráfica, expresa que la gran mayoría de los hombres no se han realizado su Prueba en el último año y solo una pequeña parte ya se la ha realizado lo que nos ayudara a seguir con la promoción y la toma de conciencia sobre la importancia de realizarse este estudio para reducir el riesgo de problemas Prostáticos.




## GRÁFICA 13



**ANÁLISIS:** La grafica presentada en esta sección muestra la frecuencia de la visita al médico, donde vemos que el 40% nunca visita al médico, el 34% lo hace cada seis meses aproximadamente, y con una igualdad en porcentajes del 13% quizás lo hace cada año y cada dos meses.

**INTERPRETACIÓN:** La frecuencia de visitas al médico también es un factor preponderante en este trabajo de investigación y observamos que la mayoría nunca visita al médico, seguido de un pequeño grupo que acude cada seis meses, cada año y cada dos meses respectivamente, lo que se expresa en que casi todos al no ir al médico se aumenta el riesgo de padecer este problema de salud tan común en nuestra población en estudio.

**GRÁFICA 14**



**ANÁLISIS:** La grafica presentada en esta sección muestra los antecedentes de cáncer en la familia, donde vemos que el 87% hace mención de que no tienen ningún antecedente de esta enfermedad, pero un 13% si tiene.

**INTERPRETACIÓN:** La grafica de arriba nos enseña como la gran mayoría de los hombres encuestados no tienen antecedentes familiares de algún tipo de cáncer, en especial el de próstata, aunque si existe una pequeña parte de la población que si tiene antecedentes lo que nos hace poner atención en este grupo para tratar de reducir en lo más posible los factores que puedan ocasionar la aparición de esta enfermedad.


**GRÁFICA 15**



**ANÁLISIS:** La variable de número de parejas es la que se muestra en la gráfica de arriba y se nota como el 87% de los hombres en estudio dicen tener una sola pareja, mientras que el otro 13% comentan que tienen dos parejas.

**INTERPRETACIÓN:** En la gráfica presentada se observa que la mayoría de los encuestados solo tiene un apareja, pero existe otra cantidad mínima que expresa tener dos parejas, esto no parece afectar tanto en el aumento del riesgo de padecer cáncer de próstata, pero es importante seguir con la promoción de la salud y la prevención de este tipo de cáncer tan frecuente en hombres adultos.


**GRÁFICA 16**



**ANÁLISIS:** La grafica presentada en esta sección muestra el inicio de vida sexual activa de los hombres en estudio y con un 67% iniciaron entre los 15 a 17 años y un 33% lo inició de los 18 a los 20 años.

**INTERPRETACIÓN:** La grafica anterior demuestra una vez más que la mayoría de los hombres encuestadas inició su vida sexual a partir de los 15 a los 17 años, una edad no tan considerable y aceptable, pero existe una pequeña parte que lo inició a una edad aceptable y en el grupo de edad menor hay que tener cuidado para darles a conocer que esta situación aumenta el riesgo de infección por contacto sexual y finalmente quizás un riesgo de padecer cáncer de próstata.


**GRÁFICA 17**



**ANÁLISIS:** La grafica presentada arriba, muestra que definitivamente casi el total de los hombres encuestadas con un 87% no consumen ningún tipo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, pero si un 13% consume alguna de estas sustancias.

**INTERPRETACIÓN:** Las toxicomanías, es decir el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas son factores preponderantes en la mayoría de las patologías, entonces en esta variable al ver que casi toda la población no consume este tipo de sustancias se reduce en gran medida el riesgo de padecer este problema tan común en la sociedad y que puede ser causa de muerte; pero existe un porcentaje menor que si podría afectar como el factor de riesgo.

**GRÁFICA 18**



**ANÁLISIS:** La tabla que se presenta arriba muestra como el 87% de los hombres no consume ningún fármaco para mejorar su actividad sexual, pero un 13% dice que, si lo consume, pero infrecuentemente.

**INTERPRETACIÓN:** Los fármacos o medicamentos que se usan para mejorar la actividad sexual si se usan con mucha frecuencia puede interferir en la salud de los hombres y esto es un factor predisponente para que en un futuro pueda aparecer problemas prostáticos y quizás el cáncer de próstata, por esta razón vemos que si es necesario enfatizar en esta información para evitar en lo más posible su consumo.

