

Alumno: Araceli Vázquez Díaz

Profesor: Lic. Maricelis Galdámez Gálvez

Actividad: cuadro sinóptico

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: evaluación psicológica clínica

Grado: 6° Cuatrimestre/ LPS

Grupo: “A”

LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

tiene como objetivo fundamental describir el problema por el que la persona acude a tratamiento

El primer aspecto, es conocer si la persona tiene un problema de abuso o dependencia

Se diferencian dos tipos de trastornos:

- 1) dependencia de sustancias psicoactivas
- 2) abuso de sustancias psicoactivas

EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL

La evaluación hay que abordarla desde una perspectiva amplia y exhaustiva

Es relevante evaluar la presencia de otros trastornos que pueden estar asociados con la dependencia del alcohol

Muchas personas con alcoholismo tienen déficit cognitivo

La evaluación se llevará a cabo tanto mediante los instrumentos citados

ENTREVISTAS

La entrevista es el primer contacto que tiene el paciente con el terapeuta

características más relevantes de la entrevista conductual con relación al alcoholismo

- * Orientación inicial
- * Evaluación inicial
- * Evaluación del consumo de alcohol y de otras drogas
- * Evaluación de otros problemas

LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL

La motivación para el cambio es un aspecto fundamental

varias estrategias motivacionales que han mostrado ser eficaces para favorecer el cambio de conducta

- 1, Dar información y aconsejar
- 2, Eliminar obstáculos
- 3, Dar diversas opciones al paciente
- 4, Disminuir los factores
- 5, Promover la empatía, entre otras mas

OBSERVACIÓN Y AUTOOBSERVACIÓN

La observación era el método de evaluación más relevante de la terapia

El método observacional es de una gran fiabilidad y precisión

En el alcoholismo se desarrollaron distintos procedimientos de observación

las pruebas de degustación y los bares experimentales

la autoobservación, utilizando autorregistros, es un procedimiento barato

Con el autorregistro sabemos fácilmente en qué ocasiones bebe, con quién, cuándo y cómo bebe

El autorregistro cumple una importante función

Cuando lleva varias semanas haciéndolo, es ya probable que haya automatizado la habilidad de autorregistrar

LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALCOHOLISMO

En los últimos años la evaluación del consumo de alcohol ha tenido un

múltiples instrumentos existentes para la evaluación del alcoholismo

- EL CAGE
- EL MALT
- EL AUDIT

es un cuestionario de autoinforme de sólo cuatro ítems

Es un instrumento que sirve para hacer diagnóstico diferencial

es un cuestionario elaborado a partir de los auspicios de la OMS para disponer de un instrumento de detección

ESTADIOS DE CAMBIO

los estadios de cambio han mostrado ser un elemento claramente predictivo para asistir o no a un tratamiento

En su última formulación, Prochaska considera seis estadios de cambio

precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y finalización

REGISTROS PSICOFISIOLÓGICOS

La evaluación psicofisiológica viene a constituir un procedimiento de observación sobre procesos psicofisiológicos

Es importante diferenciar entre evaluación fisiológica y evaluación psicofisiológica

La diferencia está en que en la evaluación psicofisiológica lo importante es encontrar relación entre determinadas condiciones psicológicas y la actividad fisiológica

ENTREVISTAS

Antes de diseñar un tratamiento es necesario conocer exhaustivamente distintos aspectos relacionados con la conducta de fumar

Entre las áreas más importantes de la conducta de fumar a ser evaluadas se incluyen las variables demográficas

DIAGNÓSTICO DE LA DEPENDENCIA

Cuantificar el grado de dependencia de la nicotina de un fumador es importante porque aquellos que tienen una dependencia elevada es más probable que necesiten una terapia más intensiva

el dsm-iv-tr apa recoge, dentro de los trastornos relacionados con sustancias psicoactivas

Los síntomas del síndrome de abstinencia pueden remedar, disfrazar o agravar los síntomas de otros trastornos psiquiátricos o los efectos secundarios de otras medicaciones