



Mi Universidad

SUPER NOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: NELVA MARIA LUCAS RUEDA

**NOMBRE DEL TEMA: PADECIMIENTOS DE HIGADO Y VIAS VILIARES:
PROBLEMAS HEPATICOS Y PROBLEMAS BILIARES**

PARCIAL: SEGUNDO

NOMBRE DE LA MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

NOMBRE DEL PROFESOR: JAIME HELERIA CERON

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: LICENCIATURA EN ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 6TO

FECHA DE ENTREGA: A 14 DE JUNIO DEL 2022 PICHUCALCO CHIAPAS

PADECIMIENTOS DE HIGADO Y VIAS BILIARES

El hígado es el órgano visceral más grande del cuerpo; pesa alrededor de 1,3 kg en el adulto. Se ubica por debajo del diafragma y ocupa gran parte del hipocondrio derecho. Desde la perspectiva anatómica, el hígado se divide en 2 lóbulos grandes (lóbulos derecho e izquierdo) y 2 lóbulos más pequeños (los lóbulos caudado y cuadrado, el hígado se encuentra contenido por la caja torácica y, por lo regular, no puede nalmarse en nersonas saludables



Tiene varias funciones para el organismo, como metabolizar la glucosa y la proteína, metabolizar medicamentos y toxinas, almacenar vitaminas e hierro, formar la bilis y producir diversas sustancias relacionadas a la coagulación sanguínea. Cuando algo no está bien, la persona puede presentar señales y síntomas como estómago hinchado, fuerte dolor abdominal y también, un aspecto amarillento en el color de la piel y de los ojos y orina más oscura.

ESTEATOSIS HEPATICA

Causada por la acumulación de grasa en el hígado, provocada por muchas causas distintas, como la ingesta de los alimentos con mucha grasa, bebida alcohólicas en exceso, algunos medicamentos y toxinas, obesidad, hipertensión arterial diabetes. Los síntomas son poco perceptibles, pero sin o es tratado, pueden evolucionar a un grado más grave.



ESTEATOSIS HEPÁTICA

Antes, ¿debes de saber qué es ESTEATOSIS!

También denominada "cambio grasa", es la acumulación anómala de triglicéridos en el interior de las células parenquimatosas.

¿Los Afectados?

Principalmente el hígado, por su esencial participación en el metabolismo graso.

YO?

Jakaira M. Medina F. 100471144

Entonces... 😞

Esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos en los *hepatocitos*.

Causas

Abuso del alcohol (AFLD), diabetes mellitus, obesidad, anoxia, toxinas (NAFLD).

Manifestaciones clínicas

Dolor abdominal, digestión lenta, saciedad, astenia, hepatomegalia, ictericia, esplenomegalia.

Microscopía



Macroscopía

ICTERICIA OBSTRUCTIVA

- ◆ Dolor abdominal
- ◆ Fiebre, escalofríos
- ◆ Cirugía biliar previa
- ◆ Edad avanzada
- ◆ Masa palpable
- ◆ Aumento predominante de bi y FAL
- ◆ Quick normal o que se normaliza con vit K

Provocada por diferentes causas que lleva a la obstrucción de los canales biliares, tales como presencia de cálculos en las vías biliares, diversos tipos de tumores o incluso enfermedad de los propios canales biliares, como colangitis esclerosis primaria.

El color amarillo se debe a la bilirrubina acumulada en la piel, a menudo causada por trastornos del hígado y la vesícula biliar



Piel amarillenta (ictericia)

La persona puede presentar una coloración amarillenta en la piel, la orina con un amarillo fuerte y heces más claras y la parte blanca de los ojos (llamada esclerótica) también puede ponerse amarillenta.




CIRROSIS E HIPERTENSION PORTAL

Causas de cirrosis hepática

- ▶ Virus de hepatitis B, hepatitis C, y hepatitis D.
- ▶ Consumo excesivo de alcohol.
- ▶ Hígado graso no alcohólico también llamada esteatohepatitis no alcohólica
- ▶ Enfermedades hereditarias o congénitas como:
 - Hemocromatosis, en la cual se acumula hierro dentro del hígado dañado el tejido.
 - La enfermedad de Wilson, la cual es causada por una alteración en el transporte del cobre, acumulándose en el hígado y en otros tejidos.

La causa más común de la hipertensión portal es la cirrosis, o cicatrización del hígado. La cirrosis es resultado de la curación de una lesión del hígado causada por la hepatitis, el abuso de alcohol, u otras causas de daño al hígado.



CANCER DE HIGADO


Etapas del daño hepático



Colangiocarcinoma

También llamado cáncer de vías biliares, proviene de los tejidos de los conductos que conectan el hígado con la vesícula biliar y la vesícula biliar con el intestino delgado (vías biliares hepáticas) (Vía CancerQuest).

Es un tipo de cáncer cuyos síntomas suelen ser variantes, por ello tiende a confundirse con enfermedades del hígado como la cirrosis o la hepatitis.



Los cálculos biliares pueden variar de tamaño y número, y pueden causar síntomas o no.

Las personas que presentan síntomas generalmente necesitan cirugía para la extracción de la vesícula biliar. Los cálculos biliares que no provocan síntomas generalmente no necesitan tratamiento.

Cáncer que comienza en las células del hígado,

Se trata del tipo más común de cáncer de hígado, su inicio es a través del crecimiento anormal de la célula hepatocitos, una célula específica del hígado que es el comienzo del tumor. Tiende a presentarse en pacientes mayores de 50 años, en su mayoría hombres.

https://www.google.com/search?q=WWW.ELSEVIER.ES++ENFERMEDAD+ES+DEL+HIGADO&ei=gheoYrasJP3UkPIpqcqlsA4&ved=0ahUKEwi29fGFIqz4AhV9KkQIHsviCeYQ4dUDCA4&uact=5&oq=WWW.ELSEVIER.ES++ENFERMEDADES+DEL+HIGADO&gs_lcp=